Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Леонид

Возраст: 30

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 14.02.2021 10:13:56

формирования заключения врача: 14.02.2021 16:44:10

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/307583/answer/307589

Заключение врача

Здравствуйте! Механизм действия алпростадила и ингибиторов ФДЭ-5 не тождественны. Хотя в первом приближении тест с ИФДЭ-5 можно использовать. Но надо помнить, что при использовании ИФДЭ-5 необходима сексуальная стимуляция. Т.е. необходимо создать определённые условия в УЗИ -кабинете и зарезервировать как минимум двойное время на исследование. В принципе это возможно, но требует индивидуальной договорённости. Очевидно, в поисковике необходимо ввести необходимые пожелания и прозвонить клиники. В связи с основной жалобой- деформацией полового члена, можно рекомендовать комплекс Пейрофлекс, курсовой приём которого способствует замедлению прогрессирования искривления полового члена и профилактике развития болезни Пейрони после травматичного полового акта или после травмы полового члена. Удачи!