Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Саша

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 17.04.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 17.04.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/3140/answer/3141

Москва, 2025

Заключение врача

Уважаемый Саша! Вам нужен непосредственный осмотр уролога. Делов том, что врожденное искривление полового члена может встречаться при гипоспадии. Гипоспадия заключается в укорочении дистального (конечного) отдела мочеиспускательного канала. Это приводит к искривлению тела полового члена вниз, которое резко увеличивается при эрекции. В дальнейшем это приводит к невозможности вести нормальную половую жизнь. Лечение этой патологии оперативное, возможно, в несколько этапов. Необходимость операции определяет врач уролог после тщательного осмотра и обследования. Вам, Саша, следует показаться урологу по месту жительства для решения всех этих вопросов. Удачи! Шадёркин И.А.