Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Владимир

Возраст: 71

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 29.03.2024 11:29:35

формирования заключения врача: 29.03.2024 13:07:56

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/315611/answer/315613

Заключение врача

Здравствуйте, Владимир. Ваш вопрос вполне разумен и не должен вызывать удивления. Силденафил, активное вещество препаратов для лечения эректильной дисфункции, имеет взаимодействие с рядом сердечно-сосудистых препаратов, особенно с нитратами, поскольку оба средства могут вызвать значительное снижение артериального давления. Однако, в Вашем списке лекарств нитратов нет. Тем не менее, прием Силденафила у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями требует осторожности и должен производиться под строгим наблюдением врача. Амлодипин может усилить гипотензивное действие Силденафила, что тоже требует внимания. Другими словами, можно постепенно пробовать принимать препарат Силденафила и контролировать артериальное давление Но у меня не достаточно медицинских даных, чтобы однозначно ответить на Ваш вопрос: можно или нет. Исходя из Вашего состояния и текущего лечения, консультация с Вашим врачом (кардиологом или терапевтом) перед применением Силденафила необходима, чтобы избежать возможных рисков и оценить сочетаемость препаратов с учетом вашего здоровья и рисков, связанных с операцией АКШ. Ваше желание чувствовать себя полноценно – абсолютно естественно, но безопасность и здоровье должны быть на первом месте. Пожалуйста, перед приемом Силденафила обратитесь за консультацией к Вашему лечащему врачу (кардиологу или терапевту) .