

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Иван

Возраст: 21

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 15.04.2024 20:29:26

формирования заключения врача: 15.04.2024 21:26:09

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/315727/answer/315728>



Заключение врача

Здравствуй, Иван! 1. Изменение размера и эрекция. После операции обрезания в течение первых нескольких недель могут наблюдаться различные временные изменения, включая отек и изменение чувствительности. Возможно, Ваше состояние связано с временным уменьшением кровоснабжения или отеком, что может происходить в процессе заживления. Анастетики, как правило, не должны оказывать долгосрочное воздействие на эрекцию или размер. Также стоит отметить, что психологические или психогенные факторы могут существенно влиять на сексуальное здоровье и функции, включая эрекцию. Переживания, стресс, тревога и даже депрессия могут привести к временным или длительным проблемам с эрекцией. В контексте недавней хирургической процедуры, такой как обрезание, вполне естественно испытывать беспокойство или стресс из-за изменений в ощущениях, внешнем виде или функционировании полового члена. Ваша реакция может включать беспокойство о восстановлении, боли или даже о том, как эти изменения могут повлиять на Вашу сексуальную жизнь. 2. Эффекты обрезания на продолжительность полового акта и чувствительность. Обрезание может влиять на чувствительность головки полового члена, так как она становится менее защищенной от внешней среды и трения об одежду. Это может привести к уменьшению чувствительности, что иногда используется как метод для продления полового акта. Однако этот эффект может варьироваться у разных людей в диапазоне 3-6 месяцев. Если ранее головка члена терлась об одежду и это не вызывало дискомфорт, возможно, у Вас изначально высокая устойчивость к трению, и изменения могут быть не так заметны. В целом, если у Вас есть беспокойства по поводу восстановления после операции, самым правильным шагом будет обратиться к Вашему лечащему врачу или урологу, который проводил операцию. Он сможет оценить Ваше текущее состояние и, если это необходимо, назначить дополнительное лечение или обследования.