Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Дмитрий

Возраст: 22

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 28.05.2024 01:56:01

формирования заключения врача: 28.05.2024 08:25:39

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/315960/answer/315961

Заключение врача

Здравствуйте, Дмитрий! После операции по удалению кисты, важно учитывать несколько факторов перед возобновлением половой жизни: 1) Состояние раны: Если швы затянулись, но осталась небольшая рана, важно убедиться, что она полностью зажила и не вызывает болевых ощущений. 2) Рекомендации Вашего лечащего и оперирующего уролога: Они лучше знают особенности Вашей операции и могут дать более точные рекомендации по поводу физических нагрузок, включая секс. 3) Общие рекомендации: Обычно рекомендуются воздержаться от секса до полного заживления ран после хирургических вмешательств. Это может занять от 4 до 6 недель, в зависимости от сложности операции и скорости заживления у каждого конкретного пациента. 4) Ощущения: Обратите внимание на свои ощущения. Если Вы чувствуете боль, дискомфорт или заметили какие-либо признаки инфекции (покраснение, отек, гнойные выделения), следует воздержаться от секса. В Вашей ситуации лучше воздержаться от занятий сексом до полного заживления раны и не ранее 4-6 недель после операции.