Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Яцек

Возраст: 55

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 09.06.2024 22:30:09

формирования заключения врача: 10.06.2024 10:53:26

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/316049/answer/316056

Заключение врача

1) Жалобы: Пациент жалуется на отек в области головки полового члена, который усиливается в положении стоя и уменьшается в положении лежа. Также отмечает пересушенность кожи головки и обеспокоен состоянием швов после проведенной циркумцизии. 2) Анамнез заболевания: 5 июня пациенту была проведена циркумцизия по медицинским показаниям. После операции пациент обрабатывает швы раствором Бетадина и принимает антибиотики. Отмечает, что кожа головки пересушена из-за использования Бетадина при наложении повязки. 3) Анамнез жизни: Значимых событий, которые могли бы повлиять на текущее состояние, не отмечено. 4) Интерпретация предоставленных данных: Отек после циркумцизии - это распространенное явление, которое обычно уменьшается в течение нескольких недель. Усиление отека в положении стоя связано с гравитацией и повышением кровенаполнения в этой области. Пересушенность кожи может быть результатом частого использования Бетадина, который обладает подсушивающим эффектом. Швы могут выглядеть неестественно или даже воспаляться при избыточной обработке антисептиками. 5) Заключение: Состояние пациента после циркумцизии является типичным и не вызывает серьезных опасений. Однако необходимо скорректировать уход для уменьшения отека и пересушенности кожи. 6) Рекомендации: 1. Уход за швами: - Продолжайте обработку швов, но вместо Бетадина используйте более мягкие антисептики, например, Хлоргексидин или Мирамистин. - Оцените целесообразность повязок. При отсутствии сильного кровотечения или других осложнений, швы можно оставить открытыми для лучшего заживления. 2. Сухость кожи: - Для смягчения пересушенной кожи используйте увлажняющие кремы, например, Бепантен или Декспантенол, которые помогут восстановить барьерные функции кожи. - Избегайте применения подсушивающих антисептиков на открытых участках кожи головки. 3. Уменьшение отека: - Продолжайте периодически принимать горизонтальное положение в течение дня, чтобы уменьшить отек. - Можно применять холодные компрессы на область отека на 10-15 минут несколько раз в день, избегая прямого контакта льда с кожей. 4. Антибиотики: - Следуйте назначению врача относительно приема антибиотиков. Если возникают побочные эффекты или состояние ухудшается, проконсультируйтесь с врачом. 5. Наблюдение: - Обратите внимание на возможные признаки инфекции: усиление боли, покраснение, выделения из швов, повышение температуры. При их появлении немедленно обратитесь к врачу. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы или ухудшится состояние, рекомендую обратиться к врачу для очной консультации.