Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Максим

Возраст: 18

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 26.06.2024 16:24:30

формирования заключения врача: 27.06.2024 09:41:59

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/316220/answer/316227

Заключение врача

Половой орган, как и другие части тела, может пострадать от холода. Пребывание в холодной воде или на ветру может привести к переохлаждению тканей. Вот основные моменты, на которые стоит обратить внимание: 1. Переохлаждение: Продолжительное воздействие низких температур может вызвать переохлаждение, что негативно скажется на кровообращении в половых органах. Это может привести к временным проблемам с эрекцией и общему дискомфорту. 2. Воспаление: Переохлаждение может ослабить иммунитет и способствовать развитию инфекций. Воспалительные заболевания, такие как простатит (воспаление предстательной железы), могут развиться на фоне общего переохлаждения организма. Симптомы возможных проблем: - Боль или дискомфорт: Если Вы ощущаете боль или дискомфорт в области половых органов после пребывания на холоде, это может быть признаком воспаления. - Проблемы с мочеиспусканием: Затрудненное или болезненное мочеиспускание может указывать на воспалительные процессы. - Изменения в эрекции: Проблемы с эрекцией или снижение чувствительности могут быть связаны с нарушением кровообращения. - Общие симптомы простуды: Повышенная температура, слабость и ломота в теле также могут свидетельствовать о начале воспалительного процесса. Что делать: - Тепло одеваться: При купании на улице в холодное время года используйте гидрокостюм или другие средства защиты от холода. - Быстро согреться после купания: Постарайтесь сразу согреться, принять горячий душ и надеть теплую одежду. - Обратиться к врачу: Если у Вас есть вышеописанные симптомы или другие беспокоящие признаки, лучше всего очно проконсультироваться с урологом или терапевтом.