Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Данил

Возраст: 25

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 03.07.2024 11:19:25

формирования заключения врача: 04.07.2024 08:47:06

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/316272/answer/316280

Заключение врача

Я изучил представленными Вами данные. Ниже мое заключение. 1. Жалобы: Пациент жалуется на искривление полового органа в левую сторону на угол около 27 градусов. Отмечает наличие уплотнения в средней части полового члена. 2. Анамнез заболевания: Время возникновения жалоб не указано. УЗИ исследование проводилось, бляшек не обнаружено. 3. Интерпретация предоставленных данных: Искривление полового члена может быть связано с несколькими факторами, включая фиброзные изменения в кавернозных телах. Уплотнение, которое вы описываете, может быть связано с локализованным фиброзом, который может не визуализироваться как бляшка на УЗИ. Это состояние известно как болезнь Пейрони. Также причиной может быть врожденное искривление полового члена. 4. Заключение: На основании описанных симптомов и данных УЗИ, вероятнее всего, у пациента наблюдаются фиброзные изменения в кавернозных телах полового члена, что приводит к его искривлению. Болезнь Пейрони часто характеризуется наличием таких симптомов, даже если бляшки не визуализируются на УЗИ. 6. Рекомендации: • Дальнейшее обследование: Рекомендую провести дополнительное обследование, включая МРТ полового члена, для более детальной оценки состояния тканей. • Консультация специалиста: Проконсультируйтесь с урологом, специализирующимся на заболевании Пейрони, для определения дальнейшей тактики лечения. • Лечение: В зависимости от степени искривления и выраженности симптомов, могут быть предложены различные варианты лечения, такие как медикаментозная терапия (например, препарат пейрофлекс), инъекции в уплотнение, в редких случаях хирургическое вмешательство. Важно обсуждать все варианты с Вашим лечащим врачом-урологом. • Общий совет: Следите за изменениями в состоянии полового члена и незамедлительно сообщайте врачу о любых новых симптомах.