

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Сергей

Возраст: 20

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 11.07.2024 12:31:28

формирования заключения врача: 11.07.2024 12:51:07

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/316346/answer/316347>



Заключение врача

Я изучил представленными Вами данные. Ниже мое заключение. Жалобы Пациент жалуется на невозможность закрытия головки полового члена, а также на отек крайней плоти, который препятствует закрытию головки. Анамнез болезни Пациент отмечает, что симптомы появились утром после полового акта. Ранее подобных проблем не было. Пациент не сообщает о других симптомах, таких как боль, выделения или изменение цвета кожи. Интерпретация предоставленных данных Симптомы пациента указывают на возможность возникновения парафимоза — состояния, при котором головка полового члена не может вернуться в нормальное положение после обнажения, что может быть вызвано отеком крайней плоти. Это состояние может возникнуть после полового акта или мастурбации, особенно если крайняя плоть была сдвинута назад на продолжительное время. Заключение Возможный диагноз: парафимоз. Это состояние требует немедленного внимания, так как может привести к осложнениям из-за нарушенного кровообращения в головке полового члена. Рекомендации 1. Неотложная помощь: - Попробуйте аккуратно вернуть крайнюю плоть на место. Для этого можно использовать лед, завернутый в ткань, чтобы уменьшить отек, затем аккуратно попытаться сдвинуть крайнюю плоть вперед. Однако это должно быть сделано осторожно, чтобы не вызвать боль или дальнейшее повреждение. - Если самостоятельные попытки не помогают, необходимо срочно обратиться в отделение неотложной помощи или к урологу для проведения манипуляции по возвращению крайней плоти на место. 2. Дополнительные меры: - Избегайте сексуальной активности до полного восстановления. - Поддерживайте гигиену полового члена, избегайте агрессивного мытья и использования мыла, которое может вызвать раздражение. 3. Наблюдение и последующее лечение: - После устранения парафимоза следует провести обследование у уролога для оценки состояния крайней плоти и головки полового члена. Необходимо действовать быстро, чтобы избежать осложнений. В случае отсутствия улучшений или ухудшения состояния немедленно обратитесь за медицинской помощью.