Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Артём

Возраст: 18

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 10.08.2024 17:44:56

формирования заключения врача: 12.08.2024 08:47:20

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/316495/answer/316500

Заключение врача

Я изучил Ваши данные. Ниже мое заключение

Жалобы

Пациент жалуется на неэстетичный вид после операции по обрезанию крайней плоти, проведенной накануне. Пациент обеспокоен состоянием шва и внешним видом после снятия бинта.

Анамнез заболевания

1. Операция по обрезанию крайней плоти проведена 9 августа 2024 года.

2. Операция прошла без осложнений.

3. На следующее утро после операции пациент снял бинт и обнаружил, что внешний вид шва вызывает у него беспокойство.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не отмечено.

Интерпретация предоставленных данных

На фотографиях видно состояние послеоперационного шва. Наблюдаются следующие особенности:

1. **Гиперемия (покраснение)** вокруг шва, что является нормальной реакцией на хирургическое вмешательство.

2. **Наличие корок и выделений**, что также может быть нормальной частью процесса заживления.

3. **Отек и возможные гематомы** вокруг шва, что часто встречается в первые дни после операции.

Важно отметить, что в первые дни после операции по обрезанию возможны такие симптомы, как отек, покраснение и выделения. Это нормальная часть процесса заживления, однако необходимо следить за признаками инфекции, такими как сильная боль, гнойные выделения, повышение температуры тела.

Заключение

На основании предоставленных фотографий и описания, состояние пациента после операции по обрезанию крайней плоти не вызывает серьезных опасений. Наблюдаемые изменения могут быть нормальной частью процесса заживления.

Рекомендации

1. **Гигиена**: Продолжайте соблюдать гигиену полового органа, аккуратно промывая его теплой водой без использования агрессивных моющих средств.

2. **Антисептики**: Используйте рекомендованные врачом антисептические средства для обработки шва.

3. **Наблюдение**: Следите за признаками инфекции (сильная боль, гнойные выделения, повышение температуры тела). При появлении этих симптомов немедленно обратитесь к врачу.

4. **Избегайте физической активности**: В течение первых недель после операции избегайте физической активности, которая может вызвать травму шва.

5. **Контрольный осмотр**: Рекомендуется пройти контрольный осмотр у оперировавшего врача через 7-10 дней после операции для оценки процесса заживления.