

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Елена

**Возраст:** 55

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 18.08.2024 07:04:40

**формирования заключения врача:** 18.08.2024 11:00:13

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://www.03uro.ru/consultations/question/316531/answer/316532>



## Заключение врача

**Я изучил Ваши данные. Ниже мое заключение**

### Жалобы

Наличие цистостомы. Близкий пациента интересуется вопросами ухода за эпицитостомой, а также вопросами, связанными с частотой замены и промывкой катетера.

### Анамнез заболевания

Пациент имеет эпицитостому в течение 1,5 лет. Диагнозы включают доброкачественную гиперплазию предстательной железы (ДГПЖ) и рассеянный склероз.

### Анамнез жизни

Пациент страдает рассеянным склерозом, что может влиять на функции мочевого пузыря и требовать постоянного использования катетера. Другие значимые события в жизни пациентки не указаны.

### Интерпретация предоставленных данных

Катетер Фолея, используемый для эпицитостомы требуют регулярного ухода для предотвращения инфекций и других осложнений. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы и рассеянный склероз могут усложнять уход за катетером и увеличивать риск инфекций мочевыводящих путей.

### Заключение

Пациент нуждается в регулярном уходе за катетером Фолея и эпицитостомой. Учитывая наличие ДГПЖ и рассеянного склероза, особое внимание должно быть уделено профилактике инфекций и мониторингу состояния мочевыводящих путей.

### Рекомендации

#### 1. Замена катетера Фолея:

- Катетер Фолея обычно следует менять каждые 4-6 недель, но это может варьироваться в зависимости от индивидуальных обстоятельств и рекомендаций лечащего врача.
- Если катетер функционирует плохо, его следует заменить на новый, избегая промывки, чтобы минимизировать риск инфицирования верхних мочевых путей.

## **2. Промывка катетера:**

- Промывка катетера должна проводиться только в крайних случаях, когда замена невозможна, чтобы избежать риска инфицирования верхних мочевых путей.

## **3. Наблюдение у уролога:**

- Регулярные визиты к урологу необходимы для мониторинга состояния эпицитостомы и катетера, а также для оценки состояния мочевыводящих путей. Рекомендуется посещать уролога не реже одного раза в 3-6 месяцев.

## **4. Необходимые исследования:**

- Учитывая наличие катетера, общий анализ мочи и посев мочи не являются информативными из-за постоянных изменений в моче (лейкоциты, эритроциты, бактерии).

- УЗИ мочевого пузыря и почек для оценки состояния мочевыводящих путей.

## **5. Общие рекомендации:**

- Поддерживать адекватную гидратацию для предотвращения образования осадка в моче.

- Соблюдать правила гигиены при уходе за катетером и эпицитостомой.