Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Людмила

Возраст: 49

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 31.08.2024 14:40:03

формирования заключения врача: 31.08.2024 20:58:59

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/316615/answer/316619

Заключение врача

Я изучил Ваши данные. Ниже мое заключение

Жалобы

Пациентка сообщает о наличии крови в моче (гематурия) и неприятных ощущениях при мочеиспускании у мужа, которые продолжаются уже три дня. Температура тела в норме.

Анамнез заболевания

20 августа 2024 года мужу пациентки была проведена операция по удалению камня из мочеточника. После операции был установлен стенд на 4 недели. Первоначально состояние было стабильным, но спустя некоторое время появились гематурия и дискомфорт при мочеиспускании.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Кровь в моче и неприятные ощущения при мочеиспускании после установки стенда могут быть связаны с несколькими факторами:

1. **Механическое раздражение стенда**: Стенд может вызывать раздражение слизистой оболочки мочеточника и мочевого пузыря, что приводит к гематурии и дискомфорту.

2. **Инфекция мочевыводящих путей**: Хотя температура в норме, инфекция может протекать без выраженной лихорадки, особенно на фоне установленного стенда.

3. **Микротравмы**: Процедура установки стенда может вызвать небольшие повреждения, которые могут кровоточить в течение некоторого времени.

4. **Инкрустация стенда солями**: Со временем стенд может покрываться солевыми отложениями, что также может вызывать микротравмы и появление крови в моче.

Заключение

Гематурия и неприятные ощущения при мочеиспускании после установки стенда могут быть нормальными явлениями, связанными с механическим раздражением, микротравмами или инкрустацией стенда солями. Однако, необходимо исключить инфекцию мочевыводящих путей, даже при отсутствии температуры.

Рекомендации

1. **Мониторинг симптомов**:

- Продолжайте наблюдать за состоянием, особенно за наличием крови в моче и изменениями в ощущениях при мочеиспускании.

- Обратите внимание на появление других симптомов, таких как повышение температуры, боли в пояснице или ухудшение общего состояния.

2. **Лабораторные исследования**:

- Рекомендуется провести общий анализ мочи и посев мочи на микрофлору для исключения инфекции.

3. **Обратиться к лечащему врачу**:

- Если симптомы сохраняются или усиливаются, необходимо обсудить с урологом вопрос удаления стенда. Возможно, стенд требует замены или удаления из-за инкрустации солями.

4. **Общие рекомендации**:

- Увеличьте потребление жидкости, чтобы помочь промыть мочевыводящие пути.

- Избегайте физических нагрузок, которые могут усилить симптомы.