



Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Анатолий

Возраст: 31

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 10.09.2024 14:00:49

формирования заключения врача: 11.09.2024 09:33:23

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/316645/answer/316648>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на необходимость длительного приема антибиотиков (1.5 месяца) для лечения угревой сыпи и беспокоится о возможном влиянии такого лечения на почки, учитывая наличие синдрома Фрейли.

Анамнез заболевания

Пациенту был поставлен диагноз синдром Фрейли. В настоящее время ему назначен курс антибиотиков для лечения угревой сыпи сроком на 1.5 месяца.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Синдром Фрейли представляет собой аномалию почечной артерии, которая может приводить к сдавлению верхней чашечки почки, что может вызывать боль и предрасположенность к инфекциям мочевыводящих путей. Длительный прием антибиотиков при нормальной функции почки не оказывать на ее негативного влияния.

Заключение

Продолжительный прием антибиотиков при нормальной функции почки не оказывать на ее негативного влияния. Однако конкретное влияние зависит от типа антибиотика, его дозировки и индивидуальных особенностей пациента.

Рекомендации

- 1. Консультация с нефрологом или урологом:** Рекомендуется обсудить с нефрологом возможность длительного приема антибиотиков с учетом синдрома Фрейли.
- 2. Мониторинг функции почек:** Проведение регулярных анализов крови и мочи для оценки функции почек (креатинин, мочевина, общий анализ мочи).
- 3. Гидратация:** Обеспечение адекватного потребления жидкости для поддержания нормальной функции почек.

Важно: Пациенту следует внимательно следить за своим состоянием и при появлении новых симптомов (боль в пояснице, изменения в мочеиспускании, отеки) немедленно обратиться к

врачу.