

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Владимир

Возраст: 21

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 14.09.2024 20:01:14

формирования заключения врача: 15.09.2024 07:03:41

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/316656/answer/316657>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на **ноющую боль в области паха с левой стороны**, возникающую после семяизвержения. Также отмечает **случаи трудного мочеиспускания с жжением после семяизвержения**.

Анамнез заболевания

Пациент сообщает, что боль в паху появилась недавно и возникает после каждого семяизвержения. Ранее подобных симптомов не отмечал. Половую жизнь не ведет, занимается мастурбацией. ВИЧ-инфекцию исключает, так как не имел половых контактов.

Анамнез жизни

Пациент не указывает на значимые события в своей жизни, которые могли бы быть связаны с текущими жалобами. Половую жизнь не ведет, половых партнеров не имеет.

Интерпретация предоставленных данных

На основании предоставленных данных можно предположить несколько возможных причин болей в паху и трудного мочеиспускания с жжением после семяизвержения: 1. **Простатит** - воспаление предстательной железы, которое может вызывать боль в паху и проблемы с мочеиспусканием. 2. **Синдром хронической тазовой боли** - воспаление придатка яичка, которое также может вызывать боль в паху. 3. **Варикоцеле** - расширение вен семенного канатика, что может вызывать боль в паху, особенно после физической активности или семяизвержения. 4. **Нормальное явление**, не требующие никакого лечения.

Заключение

На основании симптомов можно предположить наличие воспалительного процесса в органах мочеполовой системы или нормальное состояние. Однако для точного диагноза необходимы дополнительные исследования.

Рекомендации

1. **Обратиться к урологу** для проведения следующих обследований:

1. **Общий анализ мочи** - для выявления признаков воспаления или инфекции.
2. **Микроскопия секрета предстательной железы с бактериологическим посевом** - для определения наличия воспалительного процесса и выявления возможных патогенов.

3. **УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы с определением объема остаточной мочи** - для оценки состояния этих органов и выявления возможных патологий.
 4. **Урофлоуметрия** - для оценки функции мочеиспускания и выявления возможных обструкций.
-
2. **Избегать чрезмерной мастурбации** до выяснения причины болей.
 3. **Обратить внимание на гигиену половых органов** и избегать переохлаждений.