

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Иван

Возраст: 21

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 17.09.2024 19:49:24

формирования заключения врача: 18.09.2024 07:24:01

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/316669/answer/316670>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на слущивание кожи с головки полового члена, сопровождающееся покраснением. Симптомы появились день назад после незащищенного полового акта.

Анамнез заболевания

Пациент заметил покраснение и облезание кожи на головке полового члена и прилегающей к ней ткани день назад. Симптомы возникли после незащищенного полового акта. Ранее подобных симптомов не наблюдалось.

Анамнез жизни

Значимых событий, связанных с общим состоянием здоровья, не отмечается. Пациент не сообщает о хронических заболеваниях или аллергических реакциях.

Интерпретация предоставленных данных

На предоставленном изображении видны признаки покраснения и облезания кожи на головке полового члена. Эти симптомы могут быть связаны с несколькими возможными причинами: 1. **Инфекционные заболевания:** Баланопостит, вызванный бактериальной или грибковой инфекцией. 2. **Аллергическая реакция:** Возможна реакция на латекс или другие вещества, использованные во время полового акта. 3. **Механическое раздражение:** Трение или микротравмы, возникшие в результате полового акта.

Заключение

Симптомы пациента могут указывать на инфекционное или аллергическое воспаление головки полового члена (баланопостит). Также возможно механическое повреждение кожи.

Рекомендации

1. Гигиена:

- Тщательно промывайте область полового члена теплой водой без использования мыла или агрессивных моющих средств.
- Избегайте использования ароматизированных средств для интимной гигиены.

2. Медикаментозное лечение:

- Можно использовать антисептические растворы (например, хлоргексидин) для обработки пораженной области.

- Можно использовать местно крем баланекс 2 раза в день 7-10 дней

3. Избегайте половых контактов до полного исчезновения симптомов.

4. Обратитесь к урологу для проведения обследования на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), и для уточнения диагноза.

Если симптомы сохранятся или ухудшатся, необходимо срочно обратиться к врачу для более детального обследования и назначения соответствующего лечения.