

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Владислав

Возраст: 75

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 28.09.2024 10:46:44

формирования заключения врача: 28.09.2024 17:53:59

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/316715/answer/316716>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на прекращение поступления мочи в мочеприёмник через катетер Фолея, установленный через брюшную стенку в мочевой пузырь, и на самостоятельное мочеиспускание небольшими порциями при позывах.

Анамнез заболевания

Пациенту был установлен катетер Фолея через брюшную стенку в мочевой пузырь (эпицистостома). Первоначально моча поступала в мочеприёмник через катетер, но затем этот процесс прекратился, и пациент начал мочиться самостоятельно небольшими порциями при позывах.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Прекращение поступления мочи в мочеприёмник через катетер Фолея может быть связано с несколькими причинами: 1. **Обструкция катетера:** Возможно, катетер забился осадком, кровяными сгустками или слизью. 2. **Дефляция баллона катетера:** Баллон, удерживающий катетер на месте, мог частично или полностью сдуться, что позволило катетеру сместиться. 3. **Спазм мочевого пузыря:** Спазмы мочевого пузыря могут вызывать самостоятельное мочеиспускание, несмотря на наличие катетера. 4. **Неправильное положение катетера:** Катетер мог сместиться из правильного положения, что привело к нарушению оттока мочи.

Заключение

На основании предоставленных данных можно предположить, что причиной прекращения поступления мочи в мочеприёмник через катетер Фолея и начала самостоятельного мочеиспускания могут быть обструкция катетера, дефляция баллона, спазм мочевого пузыря или неправильное положение катетера.

Рекомендации

1. Проверка катетера:

- Обратитесь к медицинскому специалисту для проверки проходимости катетера. Возможно, потребуется замена катетера.

- Убедитесь, что баллон катетера надут правильно и катетер находится в правильном положении.

2. Достаточный диурез:

- Пейте достаточное количество жидкости для поддержания нормального диуреза и предотвращения образования осадка в моче.

3. Наблюдение за симптомами:

- Следите за любыми изменениями в мочеиспускании, болевыми ощущениями или признаками инфекции (повышенная температура, мутная моча, неприятный запах).

4. Консультация с урологом:

- При сохранении проблем с катетером или появлении новых симптомов обратитесь к урологу для дальнейшего обследования и корректировки лечения.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дальнейшая помощь, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию или обратитесь за очной консультацией.