

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Станислав

Возраст: 32

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 29.09.2024 13:04:56

формирования заключения врача: 30.09.2024 08:16:05

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/316717/answer/316719>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на **боль и ощущение тепла в левом яичке** через 12 дней после операции Мармара.

Анамнез заболевания

Пациент перенес операцию Мармара по поводу варикоцеле на левом яичке 12 дней назад. Послеоперационный период протекал без осложнений до момента, когда пациент случайно слегка надавил на яичко при помывке, что вызвало боль и ощущение тепла.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Ощущение тепла и легкая боль в области яичка после операции могут быть связаны с несколькими факторами:

- Послеоперационное воспаление** - возможно, легкое воспаление или раздражение тканей после операции.
- Механическое воздействие** - надавливание на яичко могло вызвать временное усиление боли и ощущения тепла.
- Процесс заживления** - в процессе заживления тканей могут возникать различные ощущения, включая тепло и боль.

Заключение

Симптомы, описанные пациентом, могут быть нормальной реакцией на механическое воздействие и процесс заживления после операции. Однако, важно исключить инфекцию или другие осложнения, которые могут потребовать медицинского вмешательства.

Рекомендации

1. Наблюдение за симптомами:

- Следите за интенсивностью боли и ощущением тепла. Если симптомы усиливаются или появляются дополнительные признаки (покраснение, отек, выделения), необходимо обратиться

к врачу.

2. Обработка послеоперационной раны:

- Продолжайте соблюдать рекомендации по уходу за послеоперационной раной, избегайте механических воздействий на область операции.

3. Обезболивающие средства:

- При необходимости можно использовать легкие обезболивающие препараты, такие как парацетамол или ибупрофен, следуя инструкциям по применению.

4. Консультация с врачом:

- Если симптомы не проходят или усиливаются, рекомендуется обратиться к оперировавшему урологу для осмотра и исключения возможных осложнений.