

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Дмитрий

Возраст: 46

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 03.10.2024 21:00:14

формирования заключения врача: 04.10.2024 10:10:09

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/316733/answer/316735>



Заключение врача

Жалобы

Пациент интересуется длительностью безопасного приема тадалафила в дозировке 5 мг через день.

Анамнез заболевания

На данный момент отсутствует информация о причинах назначения тадалафила, а также о наличии сопутствующих заболеваний или симптомов, которые могли бы повлиять на продолжительность его приема.

Анамнез жизни

Нет данных о значимых событиях в жизни пациента, которые могли бы повлиять на его текущее состояние здоровья.

Интерпретация предоставленных данных

Тадалафил является ингибитором фосфодиэстеразы типа 5 (ФДЭ-5) и используется для лечения эректильной дисфункции и симптомов доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Дозировка 5 мг часто назначается для ежедневного приема, что может быть безопасным при длительном использовании у большинства пациентов. Однако, важно учитывать индивидуальные особенности пациента, такие как наличие сердечно-сосудистых заболеваний, почечной или печеночной недостаточности.

Заключение

На основании предоставленной информации, прием тадалафила 5 мг через день может быть безопасным для большинства пациентов, однако, необходимо учитывать индивидуальные факторы риска и наличие сопутствующих заболеваний.

Рекомендации

- Продолжить прием тадалафила** в указанной дозировке, если он был назначен врачом и не вызывает побочных эффектов.
- Проконсультироваться с лечащим врачом** для оценки общего состояния здоровья и определения оптимальной продолжительности приема препарата.
- Обратить внимание на возможные побочные эффекты**, такие как головная боль,

диспепсия, боли в спине, и сообщить о них врачу.

4. Обсудить с врачом необходимость регулярного мониторинга состояния сердечно-сосудистой системы, особенно если имеются факторы риска.

5. Поддерживать здоровый образ жизни, включая регулярные физические упражнения и сбалансированное питание, что может положительно сказаться на общем состоянии здоровья и сексуальной функции.