

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Карл

Возраст: 37

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 16.10.2024 15:27:28

формирования заключения врача: 17.10.2024 09:17:47

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/316789/answer/316792>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на **неполное наполнение головки полового члена** после проведенной циркумцизии, что наблюдается уже в течение 5 лет. Симптомы варьируются в зависимости от положения тела и позиции пениса.

Анамнез заболевания

Пациент отмечает ухудшение наполнения головки полового члена после процедуры циркумцизии, проведенной 5 лет назад. Изменения в наполнении зависят от положения тела и позиции пениса.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основной урологической проблемой, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Маловероятно, что причиной является операция циркумцизио. Можно предположить, что изменения в наполнении головки могут быть связаны с другими факторами, такими как **сосудистые изменения** или **гормональные дисбалансы** или **иметь неорганическую природу**.

Заключение

На основании предоставленной информации, вероятные причины проблемы могут включать сосудистые изменения, гормональные дисбалансы или иметь психогенную природу. Однако, для более точного диагноза необходимо проведение дополнительных исследований.

Рекомендации

- Ультразвуковое исследование полового члена с фармакодуплерографией:** поможет оценить кровоток и выявить возможные сосудистые аномалии.
- Анализ на половые гормоны (тестостерон):** для исключения или подтверждения гормональных нарушений.
- Очная консультация у уролога:** для комплексной оценки состояния и обсуждения возможных вариантов лечения.
- Психологическая поддержка:** учитывая длительность проблемы, может быть полезно

обсудить психологические аспекты и влияние на качество жизни.

5. Обсуждение с партнером: важно открыто обсудить проблему с партнером, чтобы минимизировать влияние на отношения и сексуальную жизнь.

Пожалуйста, предоставьте дополнительные медицинские данные или фотографии, если это возможно, для более детального анализа.