

## Телемедицинская консультация врача-уролога

#### Пациент:

Имя: Даниил

Возраст: 22

Пол: Мужской

### Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

## Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 25.10.2024 08:07:27

формирования заключения врача: 25.10.2024 08:55:10

## Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/316845/answer/316846



# Заключение врача

### Жалобы

Пациент жалуется на выделения белого или желтоватого цвета из уретры, которые появляются только утром при надавливании на половой член. Выделения не имеют запаха. Также отмечается периодическое жжение в уретре.

#### Анамнез заболевания

Пациент сообщает о выделениях и жжении в уретре, которые наблюдаются в течение неопределенного времени. Других симптомов, таких как боль при мочеиспускании, частое мочеиспускание или изменения в общем состоянии здоровья, не отмечается.

#### Анамнез жизни

Значимых событий, которые могли бы повлиять на текущее состояние здоровья пациента, не указано. Важно учитывать образ жизни, наличие вредных привычек, сексуальную активность и использование средств контрацепции.

## Интерпретация предоставленных данных

Выделения из уретры и жжение могут быть связаны с несколькими состояниями, включая инфекционные процессы (например, уретрит), воспалительные заболевания или физиологические изменения, такие как скопление секрета в уретре. Отсутствие запаха и специфическое время появления симптомов могут указывать на неинфекционную природу проблемы.

#### Заключение

На основании представленных данных возможно предположить наличие уретрита или другого воспалительного процесса. Однако для точного диагноза требуется дополнительная информация и обследование.

#### Рекомендации

- 1. Обратиться к врачу для проведения лабораторных исследований, таких как анализ мочи и мазок из уретры, для исключения инфекционного процесса.
- 2. Сделать микроскопию выделения, чтобы определить наличие воспалительных клеток или бактерий.

- 3. Провести соскоб уретры на ИППП методом ПЦР, чтобы исключить инфекции, передающиеся половым путем.
- 4. Воздержаться от половой жизни до получения результатов обследования, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.
- 5. Посетить уролога или дерматовенеролога для оценки результатов обследования и, если необходимо, назначения лечения.
- 6. **Избегать раздражающих факторов**, таких как агрессивные моющие средства или чрезмерное трение, которые могут усугубить симптомы.
- 7. **Обсудить с партнером наличие симптомов** и возможность совместного обследования, если это актуально.
- 8. **Поддерживать гигиену половых органов**, но избегать чрезмерного использования мыла и других химических средств.
- 9. Следить за изменениями в симптомах и при ухудшении состояния немедленно обратиться за медицинской помощью.