Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Анна

Возраст: 38

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 25.10.2024 13:06:57

формирования заключения врача: 27.10.2024 10:49:58

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/316848/answer/316859

Заключение врача

Жалобы

Мать пациента, сообщает о **жжении при мочеиспускании** у ее сына, которое проходит при приеме Канефрона, но возвращается после прекращения приема препарата.

Анамнез заболевания

Симптомы жжения при мочеиспускании у сына появились около двух недель назад. Он начал прием Канефрона, после чего жжение временно прекращается. УЗИ мочевыводящих путей рекомендовано провести в январе 2025 года.

Анамнез жизни

Пациенту была проведена лапароскопическая операция по поводу варикоцеле 26 сентября 2024 года. Важных событий, которые могли бы повлиять на текущее состояние здоровья, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Жжение при мочеиспускании может быть связано с инфекцией мочевыводящих путей (ИМП), воспалительными процессами или раздражением слизистой оболочки мочевого пузыря. Канефрон, как растительный препарат, обладает противовоспалительным и спазмолитическим действием, что может временно облегчать симптомы. Однако отсутствие стойкого улучшения после прекращения приема препарата может указывать на необходимость дальнейшего обследования.

Заключение

Симптомы у пациента могут свидетельствовать о наличии ИМП или других воспалительных процессов в мочевыводящих путях. Необходимы дополнительные данные для уточнения диагноза.

Рекомендации

1. **Обратиться к врачу** для проведения общего анализа мочи и бактериологического исследования, чтобы исключить или подтвердить инфекцию.

2. **Продолжить прием Канефрона** до получения результатов анализов, если он приносит облегчение.

3. **Обсудить с врачом возможность проведения УЗИ мочевыводящих путей** раньше запланированного срока, если симптомы сохраняются или ухудшаются.

4. **Обсудите с урологов результаты обследования**

5. **Увеличить потребление жидкости**, чтобы способствовать выведению бактерий из мочевыводящих путей.

6. **Психологическая поддержка**: обсудите с сыном возможные стрессовые факторы, которые могут способствовать ухудшению состояния, и постарайтесь их минимизировать.

Если симптомы не улучшатся или ухудшатся, необходимо срочно обратиться к врачу для более детального обследования и возможного назначения антибактериальной терапии.