

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Сергей

**Возраст:** 54

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 26.10.2024 14:28:21

**формирования заключения врача:** 27.10.2024 10:59:31

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://www.03uro.ru/consultations/question/316853/answer/316861>



# Заключение врача

## Жалобы

Пациент жалуется на **ноющую боль в области правой почки, резь в основании полового члена**, которая временно проходит после мочеиспускания, а также на **гематурию** (кровь в моче), которая проявляется днем и нормализуется к вечеру и ночью. Симптомы усиливаются после поездок на автомобиле.

## Анамнез заболевания

4 октября 2024 года пациенту был установлен мочеточниковый стент и удален камень из правого мочеточника. После операции был проведен курс антибиотикотерапии Цефтриаксоном, а после выписки пациент принимал антибиотик в капсулах в течение недели. В настоящее время продолжает прием Роватинекса по две капсулы три раза в день.

## Анамнез жизни

Пациент проживает в дачном поселке недалеко от города. Другие значимые события здоровья не указаны.

## Интерпретация представленных данных

Установка мочеточникового стента может вызывать **дискомфорт и боль**, особенно в первые дни после процедуры. **Гематурия** может быть связана с раздражением мочевых путей стентом. **Резь в основании полового члена** может быть связана с реакцией на стент или инфекцией. Усиление симптомов после физической активности, такой как поездка на автомобиле, также является распространенным явлением.

## Заключение

Симптомы пациента могут быть связаны с **раздражением мочевых путей стентом**, возможной **инфекцией мочевыводящих путей**, а также необходимо исключить **неправильное положение стента**.

## Рекомендации

- Продолжить прием Роватинекса** для облегчения симптомов.
- Провести УЗИ почек и мочевого пузыря** для исключения нарушения оттока мочи и проверки правильного положения стента.

3. **Сделать общий анализ мочи** для исключения инфекции мочевых путей.
4. **Обсудить результаты обследований с урологом** для корректировки лечения при необходимости. Иногда требуется крректировка стояния стента или для его удаления.
5. **Пить достаточное количество жидкости** для поддержания нормального диуреза и снижения риска инфекции.
6. **Избегать чрезмерной физической активности**, особенно поездок на автомобиле, до улучшения состояния.

Если симптомы сохраняются или ухудшаются, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.