

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Андрей

**Возраст:** 41

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 30.10.2024 18:54:29

**формирования заключения врача:** 31.10.2024 15:20:08

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://www.03uro.ru/consultations/question/316890/answer/316895>



# Заключение врача

## Жалобы

Пациент жалуется на **опухание пениса** и **появление язв на пенисе** после полового акта. Половая жизнь отсутствовала в течение трех месяцев до этого случая. Пациент уверен в здоровье своей супруги.

## Анамнез заболевания

Из представленной информации следует, что до возникновения симптомов половая жизнь отсутствовала в течение трех месяцев. После полового акта с супругой, у которой нет известных заболеваний, появились указанные симптомы.

## Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основной урологической проблемой, не указано. Важно уточнить наличие хронических заболеваний, аллергий, а также принимаемых лекарств.

## Интерпретация представленных данных

Опухание и язвы на пенисе могут быть связаны с несколькими факторами, включая аллергическую реакцию, инфекцию или механическое повреждение. **Аллергическая реакция** может возникнуть на латекс презерватива, смазку или другие вещества. **Инфекционные причины** могут включать бактериальные или вирусные инфекции, такие как герпес. **Механическое повреждение** может быть результатом интенсивного или продолжительного полового акта.

## Заключение

Симптомы могут указывать на инфекционное заболевание, аллергическую реакцию или механическое повреждение. Необходимо провести дополнительные исследования для уточнения диагноза.

## Рекомендации

1. **Обратиться к урологу** для очного осмотра.
2. **Провести лабораторные исследования**, включая анализ крови и мазок из уретры на ИППП методом ПЦР, для выявления возможных инфекций.
3. **Избегать половых контактов** до выяснения причины и устранения симптомов.

4. **Обсудить с супругой** возможность использования гипоаллергенных средств контрацепции или смазок, если подозревается аллергическая реакция.
5. **Поддерживать гигиену половых органов**, избегая агрессивных моющих средств. Можете использовать ванночки со слабо-розовым раствором перманганата калия 2 раза в день.
6. Если симптомы не исчезнут или ухудшатся, **немедленно обратиться за медицинской помощью**.