

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Вениамин

Возраст: 24

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 12.11.2024 16:31:36

формирования заключения врача: 15.11.2024 15:34:50

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/317050/answer/317058>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на частое мочеиспускание и отсутствие эрекции во время заболевания гриппом или простудой. Отмечает, что после мочеиспускания остается чувство неполного опорожнения мочевого пузыря. УЗИ почек и мочевого пузыря показало нормальные результаты.

Анамнез заболевания

Симптомы появились на фоне вирусного заболевания (грипп или простуда). Пациент отмечает, что во время болезни половой орган уменьшился в размере, и эрекция отсутствует даже при возбуждении.

Анамнез жизни

Значимых событий в анамнезе жизни, которые могли бы повлиять на текущее состояние, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Частое мочеиспускание и чувство неполного опорожнения мочевого пузыря могут быть связаны с воспалительными процессами в организме на фоне вирусной инфекции. Отсутствие эрекции может быть связано с общим состоянием организма во время болезни, а также с психологическими факторами. УЗИ почек и мочевого пузыря, показавшее норму, исключает структурные аномалии в этих органах.

Заключение

Симптомы пациента, вероятно, связаны с временными изменениями в организме на фоне вирусной инфекции. Отсутствие эрекции и изменения в мочеиспускании могут быть обусловлены как физиологическими изменениями, так и психологическим стрессом, связанным с болезнью.

Рекомендации

- Наблюдение за симптомами:** Если симптомы сохраняются или ухудшаются после выздоровления от вирусной инфекции, рекомендуется обратиться к урологу для дальнейшего обследования.
- Поддержка иммунной системы:** Обеспечьте достаточный отдых, полноценное питание и

гидратацию для ускорения выздоровления.

3. Психологическая поддержка: Обсудите с партнером временные изменения в сексуальной функции. Это может помочь снизить уровень стресса и улучшить психологическое состояние.

4. Избегание стресса: Постарайтесь минимизировать стрессовые ситуации и уделяйте внимание психоэмоциональному состоянию.

5. Физическая активность: Легкие физические упражнения могут улучшить общее самочувствие и ускорить восстановление.

Если симптомы не исчезнут после выздоровления, возможно, потребуется более детальное обследование для исключения других причин.