

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Павел

Возраст: 42

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 13.11.2024 18:35:53

формирования заключения врача: 15.11.2024 15:50:53

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/317053/answer/317061>



Заключение врача

Жалобы

Пациент предъявляет жалобы на изменение состояния полового члена в покое после мастурбации: увеличение размеров и плотности по бокам, увеличение головки. Также отмечает временное ухудшение потенции, которое затем вернулось в норму. Наблюдаются ночные эрекции, которые вызывают пробуждение. После половых актов ощущается легкое потягивание в области полового члена.

Анамнез заболевания

2.5 недели назад после мастурбации пациент заметил, что половой член не полностью вернулся в состояние покоя. Изменения включают увеличение размеров и плотности по бокам, а также увеличение головки. Временное ухудшение потенции наблюдалось, но через 3 дня она нормализовалась. Ночные эрекции, которых давно не было, появились 3 дня назад и вызывают пробуждение. Пациент посетил двух урологов, которые не выявили патологий.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основной урологической проблемой, не отмечено.

Интерпретация предоставленных данных

Изменения в состоянии полового члена могут быть связаны с физиологическими процессами, такими как временный отек тканей или изменения в кровоснабжении. Ночные эрекции являются нормальным явлением и могут свидетельствовать о восстановлении нормальной функции. Легкое потягивание после половых актов может быть связано с повышенной чувствительностью тканей.

Заключение

На основании предоставленных данных, серьезных патологий не выявлено. Изменения в состоянии полового члена могут быть временными и физиологическими. Ночные эрекции и восстановление потенции указывают на нормализацию функций.

Рекомендации

- 1. Наблюдение:** продолжайте наблюдать за состоянием полового члена. Если изменения сохраняются или усилятся, повторите консультацию у уролога.
- 2. Избегание травм:** избегайте чрезмерного давления или травмирования полового члена.

3. **Психологический комфорт:** обсудите с партнером свои ощущения и беспокойства. Это может помочь снизить уровень стресса и улучшить общее состояние.

4. **Здоровый образ жизни:** поддерживайте здоровый образ жизни, включая регулярные физические упражнения и сбалансированное питание.

5. **Дополнительные обследования:** если симптомы сохраняются, рассмотрите возможность проведения дополнительных обследований, таких как ультразвуковое исследование или доплерография для оценки кровотока.