

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Сергей

Возраст: 33

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 17.11.2024 03:24:47

формирования заключения врача: 19.11.2024 22:07:37

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/317071/answer/317090>



Заключение врача

Жалобы

Пациент общается о кровотечении после орального секса, описывая это как разрыв сосуда в уретре.

Анамнез заболевания

Инцидент произошел во время орального секса. Пациент не упоминает о предыдущих проблемах с уретрой или других связанных симптомах.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основной урологической проблемой, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Вероятнее всего, повреждение связано с уздечкой полового члена, а не с сосудом уретры. Уздечка — это участок кожи, соединяющий головку полового члена с крайней плотью, и она действительно может быть подвержена разрывам при механическом воздействии.

Заключение

На основании предоставленной информации вероятной причиной кровотечения является разрыв уздечки полового члена. Это состояние часто встречается и обычно заживает самостоятельно, но требует наблюдения за симптомами.

Рекомендации

- Гигиена:** Поддерживайте хорошую гигиену половых органов, чтобы предотвратить инфекцию.
- Наблюдение:** Следите за симптомами. Если кровотечение усиливается или появляются другие симптомы, такие как боль или выделения, обратитесь к врачу.
- Избегание раздражителей:** Избегайте половых контактов до полного заживления, чтобы не усугубить повреждение.
- Местное лечение:** Для ускорения заживления можно использовать антисептические растворы, такие как хлоргексидин, для промывания поврежденного участка. Избегайте агрессивных средств и проконсультируйтесь с врачом перед использованием любых медикаментов.

5. Консультация специалиста: Если симптомы не проходят или ухудшаются, рекомендуется обратиться к урологу для более детального обследования и назначения лечения.