

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Анжелика

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 19.11.2024 13:59:58

формирования заключения врача: 20.11.2024 09:12:13

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/317088/answer/317108>



Заключение врача

Жалобы

Пациентка сообщает о нарушении микрофлоры, возникшем на фоне переохлаждения, и интересуется возможными последствиями полового акта во время приема препарата Дазолик.

Анамнез заболевания

Пациентке был назначен препарат Дазолик и Дазолик Леди для коррекции нарушения микрофлоры. Нарушение микрофлоры связано с переохлаждением. Пациентка интересуется, что может произойти, если половой акт произошел во время приема препарата, несмотря на рекомендации инструкции.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим вопросом, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Дазолик (орнидазол) является противомикробным и противопротозойным препаратом, который часто используется для лечения инфекций, вызванных анаэробными бактериями и простейшими. В инструкции к препарату может быть указано воздержание от половых контактов, чтобы избежать передачи инфекции и обеспечить максимальную эффективность лечения. Половой акт во время приема препарата может снизить его эффективность и увеличить риск повторного заражения.

Заключение

Половой акт во время приема Дазолика может повлиять на эффективность лечения и увеличить риск повторного заражения или передачи инфекции партнеру. Это может также привести к необходимости повторного курса лечения.

Рекомендации

- 1. Воздержание от половых контактов:** Рекомендуется воздержаться от половых контактов до завершения курса лечения и подтверждения восстановления нормальной микрофлоры.
- 2. Обсуждение с партнером:** Важно обсудить с партнером необходимость временного воздержания для достижения наилучших результатов лечения.
- 3. Контрольное обследование:** После завершения курса лечения рекомендуется пройти

контрольное обследование для подтверждения восстановления микрофлоры.

4. Обсуждение с врачом: Если возникли дополнительные вопросы или беспокойства, рекомендуется обсудить их с лечащим врачом для получения более детальных рекомендаций.