Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Семен

Возраст: 22

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 20.11.2024 17:18:38

формирования заключения врача: 20.11.2024 21:23:15

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/317110/answer/317112

Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на боль в половом члене после удаления мочевого катетера и интересуется, когда можно возобновить половую активность после операции трепанации черепа.

Анамнез заболевания

Пациент перенес операцию трепанации черепа. В послеоперационном периоде был установлен мочевой катетер, который впоследствии был удален. В настоящее время пациент испытывает боль в половом члене после удаления катетера.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Боль в половом члене после удаления катетера может быть связана с раздражением или микротравмами уретры, что является распространенным явлением. Обычно такие симптомы проходят в течение нескольких дней. Что касается половой активности после трепанации черепа, это зависит от общего состояния пациента и рекомендаций лечащего врача. Важно учитывать риск повышения внутричерепного давления и других осложнений.

Заключение

Симптомы, описанные пациентом, могут быть временными и связаны с недавними медицинскими вмешательствами. Однако, учитывая недавнюю операцию на черепе, необходимо соблюдать осторожность.

Рекомендации

1. **Наблюдение за симптомами**: Если боль в половом члене не проходит в течение нескольких дней или усиливается, рекомендуется обратиться к урологу на очный прием.

2. **Воздержание от половой активности**: Рекомендуется воздержаться от половой активности до получения разрешения от лечащего врача, особенно учитывая недавнюю операцию на черепе.

3. **Общение с лечащим врачом**: Обсудите с врачом любые симптомы или беспокойства, связанные с вашим состоянием.