

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Иван

Возраст: 31

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 24.11.2024 11:55:30

формирования заключения врача: 24.11.2024 12:19:01

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/317138/answer/317144>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на **потерю чувствительности полового члена** в течение двух лет. Эрекция присутствует, но иногда снижается из-за отсутствия ощущений во время полового акта, что приводит к ощущению только механических движений.

Анамнез заболевания

Проблема началась около двух лет назад. Пациент обратился к урологу, который рекомендовал сдать анализы крови на общий тестостерон, ГСПГ, пролактин, а также провести бактериальный посев эякулята с определением чувствительности к антибиотикам. Также было назначено УЗИ простаты. Уролог прописал антибиотик **Цефиксим 400 мг** и свечи **Простатекс**.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основной урологической проблемой, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Учитывая наличие эрекции, но отсутствие ощущений, можно предположить, что проблема может быть связана с неврологическими или психологическими факторами. Гормональные изменения также могут играть роль. Назначенные анализы и УЗИ простаты помогут исключить инфекционные и гормональные причины. Цефиксим и Простатекс могут быть эффективны, если причина связана с инфекцией или воспалением простаты, но в данном случае это маловероятно.

Заключение

На основании предоставленной информации, потеря чувствительности может быть связана с неврологическими или психологическими факторами, а также с гормональными изменениями. Необходимо более детально выяснить, какие именно функции полового члена сохранены, чтобы уточнить диагноз.

Рекомендации

- 1. Провести рекомендованные анализы:** Это поможет уточнить причину потери чувствительности и исключить гормональные и инфекционные причины.
- 2. Консультация невролога:** Для исключения неврологических причин потери

чувствительности.

3. Консультация психотерапевта: Психологические факторы могут играть значительную роль в изменении чувствительности. Работа с психотерапевтом может помочь в выявлении и устранении возможных психологических барьеров.

4. Поддержка партнера: Обсудите проблему с партнером, это может помочь снизить психологическое напряжение и улучшить качество половой жизни.

5. Здоровый образ жизни: Избегание стрессов, регулярные физические упражнения и правильное питание могут положительно сказаться на общем состоянии здоровья и сексуальной функции.