

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Данил

Возраст: 24

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 04.12.2024 18:10:47

формирования заключения врача: 04.12.2024 22:18:21

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/317229/answer/317232>



Заключение врача

Жалобы

Пациент обращается с вопросом о возможности передачи пиелонефрита от женщины к мужчине через половой контакт без использования презерватива.

Анамнез заболевания

Пиелонефрит — это инфекционно-воспалительное заболевание почек, которое чаще всего вызывается бактериями, попадающими в почки из нижних отделов мочевых путей. В большинстве случаев пиелонефрит не передается половым путем, так как он обычно вызывается бактериями, которые уже присутствуют в организме, например, *Escherichia coli*.

Анамнез жизни

Нет данных о значимых событиях в жизни пациента, которые могли бы повлиять на развитие пиелонефрита.

Интерпретация предоставленных данных

Пиелонефрит не является инфекцией, передающейся половым путем. Он развивается в результате восходящей инфекции, когда бактерии из нижних мочевых путей поднимаются в почки. Основные факторы риска включают анатомические аномалии мочевых путей, наличие катетеров, предшествующие инфекции мочевых путей и т.д..

Заключение

Пиелонефрит не передается половым путем. Вероятность передачи инфекции через половой контакт крайне мала, так как пиелонефрит обычно вызывается бактериями, которые уже присутствуют в организме. Однако, если у партнера есть инфекция мочевых путей, существует риск передачи бактерий, которые могут вызвать инфекцию у другого партнера, но это не специфично для пиелонефрита.

Рекомендации

- Обследование и лечение:** Если у вас есть симптомы инфекции мочевых путей (например, боль при мочеиспускании, частое мочеиспускание, боль в боку), рекомендуется обратиться к урологу для обследования и, при необходимости, назначения антибиотикотерапии.
- Гигиена:** Соблюдайте личную гигиену и используйте барьерные методы контрацепции, чтобы снизить риск передачи инфекций, которая может передаваться половым путем.

3. Образ жизни: Поддерживайте здоровый образ жизни, включая адекватное потребление жидкости и регулярное мочеиспускание, чтобы снизить риск инфекций мочевых путей.

4. Психологические аспекты: Обсудите с партнером любые проблемы, связанные с инфекциями, и поддерживайте открытое общение для улучшения взаимопонимания и снижения стресса, связанного с заболеваниями.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или симптомы, не стесняйтесь обращаться за медицинской помощью.