

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Никита

Возраст: 18

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 08.12.2024 08:26:10

формирования заключения врача: 08.12.2024 10:21:46

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/317242/answer/317244>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на периодические боли в области яичек, с эпизодами боли в левом и правом яичках, диагностированными как перекрут гидатиды и орхит.

Анамнез заболевания

5 ноября пациент обратился с болью в левом яичке, подозревался перекрут яичка. После операции был диагностирован перекрут гидатиды. 29 ноября пациент снова обратился с болью в правом яичке, был поставлен диагноз орхит и назначен недельный курс таблеток. Боли временно утихли, но 6 декабря боли возобновились, и 7 декабря была проведена операция, подтвердившая перекрут гидатиды.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не отмечено.

Интерпретация предоставленных данных

1. **Перекрут гидатиды** может иногда быть ошибочно диагностирован как орхит, особенно если симптомы схожи, такие как боль и воспаление. Однако, перекрут гидатиды требует хирургического вмешательства, в то время как орхит часто лечится медикаментозно. 2. **Осложнения** при неправильной диагностике могут включать продолжение боли и воспаление, что может потребовать более сложного лечения в будущем. Однако, в вашем случае, повторная операция устранила проблему перекрута гидатиды.

Заключение

Ситуация с перекрутом гидатиды и орхитом может быть сложной для диагностики, особенно в условиях острого воспаления. В вашем случае, хирургическое вмешательство было необходимым и своевременным.

Рекомендации

1. **Восстановление яичка:** Обычно занимает несколько недель. Следует избегать физических нагрузок и травм в области яичек.
2. **Посещение бани:** Рекомендуется воздержаться от посещения бани в течение как минимум 4-6 недель после операции, чтобы избежать перегрева и дополнительного стресса на ткани.

3. **Мастурбация:** Рекомендуется воздержаться от мастурбации в течение 4 недель после операции, чтобы дать время на полное восстановление тканей и избежать дискомфорта.

4. **Психологический аспект:** Обсудите свои переживания с близкими или специалистом, если чувствуете тревогу. Это поможет справиться со стрессом и улучшить общее состояние.

5. **Дополнительные консультации:** Если боли или дискомфорт сохраняются, рекомендуется обратиться к урологу для дальнейшего наблюдения и консультации.