

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Андрей

Возраст: 36

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 22.12.2024 23:26:31

формирования заключения врача: 23.12.2024 11:17:15

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/318055/answer/318064>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на **выраженное выпячивание вен на половом члене** в спокойном состоянии и **жжение после возбуждения**. Ранее такие изменения не наблюдались, и вены становятся более заметными со временем.

Анамнез заболевания

Пациент ранее консультировался у уролога, который отметил, что видимые вены на половом члене являются нормальным явлением. Также был диагностирован **варикоз левого яичка (варикоцеле) 2 степени**, который был оперативно устранен. Анализы, проведенные ранее, показали нормальные результаты.

Анамнез жизни

Значительных событий, не связанных с основной урологической проблемой, не отмечено.

Интерпретация предоставленных данных

Видимые вены на половом члене, вероятно, являются **поверхностными венами**, что считается нормой и не должно вызывать беспокойства. Жжение после возбуждения с большой долей вероятности не связано с венами и может требовать дальнейшего исследования для выявления других причин.

Заключение

Скорее всего, видимые вены не являются причиной жжения и других жалоб пациента. Для более точного заключения и исключения других патологий рекомендуется **очный осмотр** или предоставление фотографий проблемной области.

Рекомендации

1. Дополнительные обследования:

- Проведение **очного осмотра** у уролога для более точного заключения.
- Возможность предоставления **фотографий** для дистанционной оценки состояния.

2. Общие рекомендации:

- Поддерживать **здоровый образ жизни**, включая регулярные физические упражнения,

которые улучшают кровообращение.

- Избегать факторов, которые могут усиливать жжение, таких как чрезмерное употребление алкоголя или острой пищи.

3. Психологические аспекты:

- Обсудите свои переживания с партнером, чтобы снизить уровень стресса и тревожности.

- Если беспокойство по поводу внешнего вида полового члена вызывает значительный стресс, может быть полезна консультация с психологом.

Если симптомы сохраняются или усиливаются, рекомендуется повторная консультация с урологом для дальнейшего наблюдения и коррекции лечения.