

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Александр

Возраст: 75

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 23.12.2024 07:16:02

формирования заключения врача: 23.12.2024 11:26:54

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/318056/answer/318065>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на отклонение и разбрызгивание мочевой струи после операции по удалению фимоза, начиная с 10-го дня послеоперационного периода.

Анамнез заболевания

Пациент перенес операцию по удалению фимоза. В послеоперационном периоде, на 10-й день, начал отмечать изменения в характере мочеиспускания, выражающиеся в отклонении и разбрызгивании струи мочи.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

После операции по удалению фимоза возможны изменения в мочеиспускании. Отклонение и разбрызгивание струи могут быть вызваны несколькими факторами, такими как отек, временные изменения в анатомии уретры или наличие корок под заживающей поверхностью головки вблизи уретры, которые могут влиять на направление струи. Эти изменения часто временные и могут улучшаться по мере заживления.

Заключение

Симптомы, описанные пациентом, могут быть связаны с послеоперационными изменениями в области уретры. Это может быть временное явление, связанное с заживлением тканей и возможным отеком или наличием корок под заживающей поверхностью головки вблизи уретры.

Рекомендации

- 1. Наблюдение за симптомами:** Рекомендуется продолжать наблюдение за характером мочеиспускания. Если симптомы не улучшатся в течение нескольких недель или ухудшатся, следует обратиться к врачу.
- 2. Гигиена и уход:** Поддерживать хорошую гигиену области операции, чтобы предотвратить инфекцию и способствовать заживлению.
- 3. Консультация специалиста:** При сохранении симптомов или появлении новых жалоб,

таких как боль или признаки инфекции, рекомендуется повторная консультация с урологом.