

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Никита

Возраст: 19

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 27.12.2024 03:08:33

формирования заключения врача: 27.12.2024 08:50:48

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/318085/answer/318087>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на наличие крови в сперме (гемоспермия) после ночной поллюции. Боли при этом не отмечается, также отсутствуют боли при мочеиспускании.

Анамнез заболевания

5 ноября пациент перенес операцию по поводу перекрута и некроза гидатиды левого яичка. 29 ноября развился орхит на правом яичке. 7 декабря была проведена операция по поводу перекрута гидатиды правого яичка. Пациент не мастурбировал с 5 ноября, что составляет почти два месяца.

Анамнез жизни

Важных событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не отмечено.

Интерпретация представленных данных

Гемоспермия может быть связана с недавними хирургическими вмешательствами и воспалительными процессами в области яичек. Перенесенные операции и воспаление могут вызвать временные изменения в семявыводящих путях и предстательной железе, что может привести к появлению крови в сперме. Длительное воздержание также может повлиять на состав спермы, однако это менее вероятная причина.

Заключение

На основании представленных данных, гемоспермия, вероятно, связана с недавними хирургическими вмешательствами и воспалительными процессами. Это состояние часто бывает временным и не требует серьезного вмешательства, если нет других симптомов, таких как боль или затрудненное мочеиспускание.

Рекомендации

1. Наблюдать за состоянием: если гемоспермия повторится или появятся другие симптомы (боль, затрудненное мочеиспускание), следует обратиться к врачу для дальнейшего обследования.
2. Поддерживать здоровый образ жизни: избегать стрессов, поддерживать сбалансированное питание и достаточный уровень физической активности.
3. Обсудить с врачом возможность проведения дополнительных обследований, таких как УЗИ органов малого таза или анализы крови, если симптомы сохраняются.

4. Психологический аспект: важно не беспокоиться чрезмерно, так как стресс может усугубить состояние. Рекомендуется обсудить свои переживания с близкими или специалистом, если это необходимо.

Если состояние не улучшится или возникнут новые симптомы, рекомендуется повторная консультация с лечащим врачом для более детального обследования и возможной коррекции лечения.