

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Василий

Возраст: 76

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 28.12.2024 16:25:40

формирования заключения врача: 29.12.2024 11:05:04

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/318099/answer/318108>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на частое ночное мочеиспускание (5-6 раз за ночь). Отмечает головокружение и слабость после приема алфупроста, вплоть до падения.

Анамнез заболевания

Пациент ранее принимал тамсулозин для лечения симптомов нижних мочевых путей. После этого был назначен алфупрост, который вызвал побочные эффекты в виде головокружения и слабости.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с текущей урологической проблемой, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Частое ночное мочеиспускание у мужчин пожилого возраста часто связано с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). Тамсулозин и алфупрост относятся к альфа-адреноблокаторам, которые помогают расслабить мышцы предстательной железы и мочевого пузыря, облегчая мочеиспускание. Побочные эффекты, такие как головокружение и слабость, могут быть связаны с гипотензией (снижением артериального давления), что характерно для этой группы препаратов.

Заключение

Симптомы пациента могут быть связаны с ДГПЖ. Побочные эффекты от алфупроста указывают на необходимость пересмотра текущей терапии.

Рекомендации

- Ультразвуковое исследование (УЗИ):** Рекомендуется оценить размер предстательной железы и объем остаточной мочи для более точной диагностики и выбора терапии.
- Урофлоуметрия:** Проведение данного исследования поможет оценить скорость потока мочи и выявить возможные обструкции.
- Определение уровня ПСА (простат-специфического антигена):** Это важно для исключения злокачественных процессов в предстательной железе.
- Консультация уролога:** После проведения указанных исследований обсудите результаты с урологом для корректировки терапии или выбора другого метода лечения.
- Обсудите с лечащим врачом возможность изменения терапии:** Рассмотрите

возможность перехода на другие препараты или корректировку дозировки с учетом побочных эффектов.

6. **Проконсультируйтесь с кардиологом:** Головокружение и слабость могут быть связаны с сердечно-сосудистыми проблемами, особенно в пожилом возрасте.
7. **Осторожно с приемом Урорека:** Прежде чем начать прием, обсудите это с врачом, чтобы избежать возможных побочных эффектов.
8. **Следите за уровнем артериального давления:** Регулярно измеряйте давление, особенно после приема новых препаратов.
9. **Обратите внимание на образ жизни:** Ограничьте потребление жидкости перед сном, избегайте кофеина и алкоголя, которые могут усугублять симптомы.

При наличии дополнительных симптомов или ухудшении состояния рекомендуется обратиться за очной консультацией к урологу или терапевту.