

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Игорь

Возраст: 48

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 29.12.2024 12:15:08

формирования заключения врача: 29.12.2024 18:08:40

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/318112/answer/318113>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на **частое мочеиспускание, алию мочу** с примесями крови, особенно к вечеру, и **жжение при мочеиспускании**. Отмечает, что при большем объеме мочи цвет становится менее алым, и жжение уменьшается. Болей нет, температура варьируется от 35.9 до 37.3 градусов Цельсия.

Анамнез заболевания

Пациент перенес операцию по удалению камня из мочеточника размером 10 мм с помощью лазерной литотрипсии. После операции установлен гибкий стент, который планируется оставить на 3 недели. Прошло трое суток с момента операции.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных непосредственно с урологической проблемой, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

После установки стента в мочеточник, **частое мочеиспускание и гематурия** (наличие крови в моче) могут быть нормальными явлениями. Стент может вызывать раздражение стенок мочеточника и мочевого пузыря, что приводит к вышеуказанным симптомам. **Жжение при мочеиспускании** также может быть связано с раздражением слизистой. **Колебания температуры** в пределах 35.9-37.3 градусов Цельсия могут быть реакцией организма на оперативное вмешательство, однако важно следить за повышением температуры, так как это может указывать на инфекцию.

Заключение

Текущие симптомы могут быть связаны с наличием стента и недавним оперативным вмешательством. Однако, если симптомы ухудшаются или появляются новые, такие как сильная боль или значительное повышение температуры, это может потребовать более детального обследования.

Рекомендации

- Гидратация:** Увеличьте потребление жидкости, чтобы уменьшить концентрацию мочи и снизить раздражение.
- Наблюдение за симптомами:** Следите за изменениями в симптомах, особенно за

повышением температуры выше 37.5 градусов Цельсия или появлением сильной боли.

3. **Обратитесь к урологу**, если симптомы ухудшаются или появляются новые.

4. **Психологический комфорт**: Понимание того, что некоторые симптомы могут быть нормальными после установки стента, может помочь снизить тревожность.