

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Евгений

Возраст: 20

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 01.01.2025 15:46:39

формирования заключения врача: 01.01.2025 16:51:28

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/318123/answer/318124>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на появление алой крови после массажа простаты. Кровь выделялась дважды, образуя достаточно большое пятно на бумаге, но через 5 минут кровотечение прекратилось.

Анамнез заболевания

Пациент страдает хроническим простатитом. Уролог назначил курс массажа простаты в качестве лечебной процедуры. После одного из сеансов массажа пациент заметил кровянистые выделения.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не отмечено.

Интерпретация предоставленных данных

Кровянистые выделения после массажа простаты не являются нормой и могут указывать на травматизацию тканей простаты или наличие других патологий. Это требует внимания и обсуждения с лечащим урологом для предотвращения возможных осложнений.

Заключение

Выделение крови после массажа простаты не должно происходить и требует пересмотра целесообразности данной процедуры. Это может указывать на необходимость изменения подхода к лечению хронического простатита.

Рекомендации

- Консультация уролога:** Обсудите возникшую ситуацию с лечащим урологом. Возможно, потребуется пересмотр использования массажа простаты в вашем случае.
- Альтернативные методы лечения:** Рассмотрите возможность использования других методов лечения хронического простатита, таких как медикаментозная терапия или физиотерапия.
- Дополнительные обследования:** При необходимости, проведите дополнительные исследования, такие как УЗИ простаты или анализы крови (на свертываемость), для уточнения состояния тканей простаты.

4. **Обратная связь:** Сообщите врачу о любых изменениях в симптомах или новых жалобах, чтобы своевременно скорректировать план лечения.