

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Кирилл

Возраст: 19

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 02.01.2025 17:37:33

формирования заключения врача: 02.01.2025 18:19:19

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/318131/answer/318133>



Заключение врача

Жалобы

Пациент обращается с вопросом о правильности заживления после обрезания, проведенного 17 дней назад. Отмечает наличие припухлости вокруг головки полового члена.

Анамнез заболевания

17 дней назад пациенту было проведено обрезание. Послеоперационный уход включает обработку хлоргексидином и нанесение мази Левомеколь.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основной урологической проблемой, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

На 17-й день после обрезания заживление обычно продолжается, и наличие некоторой припухлости может быть нормальным явлением. Хлоргексидин и Левомеколь помогают предотвратить инфекцию и способствуют заживлению. Однако, для более точной оценки состояния раны и исключения осложнений, таких как инфекция или чрезмерное воспаление, требуется визуальный осмотр.

Заключение

На данном этапе заживление может считаться нормальным, однако для окончательной оценки необходим визуальный осмотр. Припухлость может сохраняться в течение нескольких недель, но должна постепенно уменьшаться.

Рекомендации

- Продолжайте уход:** Продолжайте обработку хлоргексидином и нанесение мази Левомеколь, как рекомендовано.
- Наблюдайте за симптомами:** Обратите внимание на признаки инфекции, такие как усиление боли, покраснение, выделения или повышение температуры.
- Фотографии для оценки:** Для дистанционной оценки качества заживления можно сделать фотографии. Убедитесь, что фотографии четкие, сделаны при хорошем освещении и показывают область заживления со всех сторон.
- Очный осмотр:** Если припухлость не уменьшается или появляются другие тревожные

симптомы, рекомендуется очный визит к урологу для более детальной оценки.