



Информационно-консультативный портал
для урологических пациентов
18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Александр

Возраст: 64

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 09.01.2025 13:01:45

формирования заключения врача: 09.01.2025 15:39:12

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/318194/answer/318195>



Заключение врача

Жалобы

Пациент интересуется подготовкой к сдаче анализа на простатспецифический антиген (ПСА) и возможным влиянием процедуры фиброгастроуденоскопии (ФГДС) на уровень ПСА. Также интересуется минимальным интервалом между сдачей анализа ПСА и проведением ФГДС.

Анамнез заболевания

На данный момент информация о предыдущих заболеваниях или результатах обследований не представлена. Пациенту 65 лет, что может быть связано с повышенным интересом к уровню ПСА в связи с возрастными изменениями в предстательной железе.

Анамнез жизни

Значимые события, не связанные с урологической проблематикой, не указаны. Важно учитывать общее состояние здоровья пациента и наличие хронических заболеваний, которые могут влиять на результаты анализов.

Интерпретация предоставленных данных

Подготовка к сдаче анализа на ПСА включает несколько важных моментов:

- Избегайте физических нагрузок и сексуальной активности за 48 часов до сдачи анализа, так как это может повлиять на уровень ПСА.
- Рекомендуется сдавать анализ натощак, хотя это не является обязательным требованием.
- Избегайте проведения ректального исследования или других манипуляций с предстательной железой за неделю до сдачи анализа.

Процедура ФГДС, как правило, не влияет на уровень ПСА, так как она не связана с манипуляциями в области предстательной железы. Однако для точности результатов рекомендуется выдержать интервал в несколько дней между этими процедурами, чтобы исключить возможное влияние стресса или других факторов на организм.

Заключение

На основании предоставленной информации, процедура ФГДС не должна существенно влиять на уровень ПСА. Однако для уверенности в точности результатов анализа рекомендуется соблюдать подготовительные меры и выдерживать небольшой интервал между процедурами.

Рекомендации

1. Соблюдайте рекомендации по подготовке к сдаче анализа на ПСА, включая избегание физических нагрузок и сексуальной активности за 48 часов до анализа.
2. Планируйте сдачу анализа ПСА и проведение ФГДС с интервалом в несколько дней, чтобы исключить возможное влияние стресса или других факторов.
3. Если у вас есть хронические заболевания или принимаете лекарства, обсудите это с врачом, так как это может повлиять на результаты анализов.
4. При наличии дополнительных вопросов или необходимости в более детальной информации, обратитесь к лечащему врачу для получения индивидуальных рекомендаций.