

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Татьяна

Возраст: 48

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 21.01.2025 19:57:37

формирования заключения врача: 22.01.2025 08:59:50

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/318387/answer/318389>



Заключение врача

Жалобы

Пациентка обеспокоена увеличением одной из почек у своего 9-летнего ребенка после перенесенного сальмонеллеза. Несмотря на нормализацию всех анализов, размер одной почки остается увеличенным, что вызывает беспокойство.

Анамнез заболевания

У ребенка был диагностирован сальмонеллез, сопровождавшийся сильным обезвоживанием. Во время болезни обе почки были увеличены. После завершения лечения, одна почка вернулась к нормальному размеру, тогда как вторая осталась увеличенной. Прошло 25 дней с момента завершения лечения.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим вопросом, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Увеличение почек во время инфекционных заболеваний, таких как сальмонеллез, может быть связано с реакцией организма на инфекцию и обезвоживание. Восстановление размеров почек после лечения может занять некоторое время. Разница в размере почек (0.8 см) может быть вариантом нормы, но также может указывать на задержку восстановления или другие процессы, требующие наблюдения.

Заключение

Увеличение одной из почек после перенесенного сальмонеллеза может быть временным явлением. Однако, учитывая разницу в размерах почек, важно продолжать наблюдение, чтобы исключить возможные патологические процессы.

Рекомендации

- Продолжить наблюдение** за размером почек с помощью регулярных ультразвуковых исследований, чтобы отслеживать динамику изменений.
- Консультация детского уролога-андролога и нефролога** для более детальной оценки состояния почек и исключения возможных патологий в клинике.
- Поддержание адекватного водного баланса** у ребенка, чтобы избежать обезвоживания и

поддерживать нормальную функцию почек.

4. **Психологическая поддержка** для ребенка и семьи, так как стресс от болезни может влиять на общее состояние здоровья.

5. **Обсудите с лечащим врачом** возможность проведения дополнительных исследований, если размер почки не нормализуется в течение нескольких месяцев.