

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: салават

Возраст: 69

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 23.01.2025 23:49:29

формирования заключения врача: 24.01.2025 10:33:25

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/318400/answer/318401>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на разбрызгивание струи мочи и отклонение струи в сторону в начале мочеиспускания после удаления катетера. Также отмечает необходимость напрягаться для выравнивания струи и наличие небольших уплотнений при прощупывании головки полового члена.

Анамнез заболевания

Пациенту был установлен мочевого катетер на 9 дней. После его удаления возникли проблемы с мочеиспусканием, включая разбрызгивание и отклонение струи, а также ощущение уплотнений в области головки полового члена.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Разбрызгивание струи мочи и ее отклонение могут быть связаны с временными изменениями в уретре после длительного нахождения катетера. Уплотнения на головке полового члена могут быть результатом микротравм или воспалительных изменений, вызванных катетеризацией. Обычно такие симптомы проходят в течение нескольких дней, но важно следить за их динамикой.

Заключение

Симптомы, описанные пациентом, вероятно, связаны с недавним удалением катетера и могут быть временными. Однако, учитывая возраст пациента и наличие уплотнений, необходимо более внимательное наблюдение.

Рекомендации

- Наблюдение за симптомами:** Если проблемы с мочеиспусканием или уплотнения не проходят в течение нескольких дней или усиливаются, рекомендуется обратиться к урологу на очный прием для более детального обследования.
- Гигиена и уход:** Поддерживайте хорошую гигиену полового члена, чтобы предотвратить возможные инфекции. Используйте мягкие моющие средства и избегайте раздражающих веществ.
- Общение с лечащим врачом:** Обсудите с врачом любые изменения в симптомах или

новые беспокойства, чтобы своевременно скорректировать лечение или провести дополнительные исследования.

4. **Психологическая поддержка:** Поскольку проблемы с мочеиспусканием могут вызывать стресс, важно сохранять спокойствие и при необходимости обсудить свои переживания с близкими или психологом.