

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Виктор Романенко

Возраст: 57

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 24.01.2025 14:52:54

формирования заключения врача: 25.01.2025 10:04:56

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/318403/answer/318407>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на ощущение "надувания" в промежности между анусом и мошонкой в начале мочеиспускания, которое затем проходит.

Анамнез заболевания

На данный момент отсутствуют данные о предыдущих обследованиях или лечении, связанных с текущими жалобами. Необходимы дополнительные диагностические исследования для уточнения состояния.

Анамнез жизни

На данный момент отсутствует информация о значимых событиях в жизни пациента, которые могли бы повлиять на текущее состояние.

Интерпретация предоставленных данных

Ощущение "надувания" в промежности может быть связано с изменениями в предстательной железе или мочевом пузыре. Это может быть связано с увеличением простаты, что часто встречается у мужчин старше 50 лет. Однако, без дополнительных данных, таких как результаты УЗИ, анализы крови и мочи, невозможно сделать окончательные выводы.

Заключение

На основании текущих жалоб можно предположить наличие изменений в предстательной железе или мочевом пузыре, однако для постановки точного диагноза необходимы дополнительные исследования.

Рекомендации

- УЗИ мочевого пузыря и простаты** с определением объема остаточной мочи для оценки состояния этих органов.
- Анализ крови на ПСА (простат-специфический антиген)** для исключения патологий предстательной железы.
- Общий анализ мочи (ОАМ)** для выявления возможных инфекций или других изменений.
- Ведение дневника мочеиспускания:** записывайте время и объем каждого мочеиспускания в течение нескольких дней. Это поможет врачу оценить частоту и объем

мочеиспускания.

5. **Урофлоуметрия:** исследование, которое измеряет скорость потока мочи и может помочь в диагностике обструкции мочевыводящих путей.

6. **Консультация уролога** для оценки результатов исследований и постановки диагноза.

Особое внимание следует уделить обсуждению с партнером любых изменений в сексуальном здоровье и поддержанию открытого диалога.

Если возникнут дополнительные вопросы или изменения в состоянии, рекомендуется обратиться за очной консультацией.