

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Димитрий

Возраст: 36

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 25.01.2025 12:58:20

формирования заключения врача: 27.01.2025 08:44:34

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/318410/answer/318417>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на затрудненное семяизвержение и неприятные ощущения сдавливания при оргазме после проведенного обрезания. Отмечает, что мочеиспускание происходит без проблем, но семяизвержение сопровождается дискомфортом.

Анамнез заболевания

Пациенту 3 недели назад было проведено обрезание по причине рубцового фимоза. Послеоперационный период прошел без осложнений, отеков и воспалений не наблюдается. На приеме у врача было отмечено, что все в порядке, однако пациента беспокоят изменения в процессе семяизвержения.

Анамнез жизни

Значительных событий, не связанных с основной урологической проблемой, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

После обрезания может наблюдаться изменение чувствительности и структуры тканей в области головки полового члена и уретры. Узкое отверстие уретры может быть связано с послеоперационным рубцеванием или изменением эластичности тканей. Это может вызывать дискомфорт и затруднение при семяизвержении. Важно отметить, что мочеиспускание происходит без проблем, что исключает значительное сужение уретры.

Заключение

Симптомы могут быть связаны с временными изменениями после обрезания, такими как рубцевание или изменение чувствительности тканей. Однако, учитывая жалобы на дискомфорт и затруднение семяизвержения, стоит рассмотреть возможность более детального обследования.

Рекомендации

- Наблюдение за симптомами:** Продолжайте наблюдать за изменениями в ощущениях и функциях. Временные изменения могут улучшиться по мере заживления тканей.
- Консультация с урологом:** Если симптомы сохраняются или усиливаются, рекомендуется повторная консультация с урологом для оценки состояния уретры и исключения стриктуры.

3. Психологическая поддержка: Обсудите свои переживания с партнером, это может помочь снизить уровень стресса и улучшить общее самочувствие.

4. Избегание раздражающих факторов: Избегайте использования агрессивных средств гигиены, которые могут раздражать чувствительные ткани.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или изменения в состоянии, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться за медицинской помощью.