Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Пётр

Возраст: 63

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 23.02.2025 05:26:25

формирования заключения врача: 23.02.2025 12:51:34

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/318643/answer/318648

Заключение врача

Жалобы

Пациент предъявляет жалобы на:

- **Повышение температуры** до 38.5°C, которая снизилась после приёма парацетамола. Ночью температура была 37.8°C, утром — 36.5°C.
- **Колющие боли в области уретерокутанеостомы**, которые возникают периодически.
- **Боли в левом яичке**, которые усиливаются при длительном сидении. Отёка нет.

Анамнез заболевания

Пациенту была выполнена **цистэктомия (удаление мочевого пузыря)** с формированием уретерокутанеостомы 3 недели назад. Послеоперационный период протекал без осложнений до вчерашнего дня, когда появилась лихорадка и боли.

Анамнез жизни

Пациент оформляет инвалидность. Дополнительная информация о сопутствующих заболеваниях или аллергиях отсутствует.

Интерпретация предоставленных данных

Лихорадка и боли в области стомы и яичка могут быть связаны с несколькими возможными причинами:

1. **Инфекция мочевых путей (ИМП)**:
   - После цистэктомии и формирования уретерокутанеостомы риск инфекций мочевых путей повышен. Лихорадка и боли могут быть признаками **пиелонефрита** или **инфекции в области стомы**.
2. **Воспаление в области стомы**:
   - Колющие боли и лихорадка могут указывать на локальное воспаление или инфицирование тканей вокруг стомы.
3. **Эпидидимит или орхит**:
   - Боли в левом яичке могут быть связаны с воспалением придатка яичка (эпидидимит) или самого яичка (орхит). Это может быть вызвано инфекцией, распространившейся из мочевых путей.
4. **Послеоперационные осложнения**:
   - Лихорадка может быть признаком послеоперационных осложнений, таких как **абсцесс** или **флегмона** в области операции.

Заключение

Наиболее вероятными причинами лихорадки и болей являются **инфекция мочевых путей**, **воспаление в области стомы** или **эпидидимит/орхит**. Требуется срочная диагностика и лечение.

Рекомендации

Для уточнения диагноза и начала лечения рекомендуется следующее:

1. **Срочный анализ мочи**:
   - Сдайте **общий анализ мочи (ОАМ)** и **посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам**. Это поможет выявить наличие инфекции и определить подходящий антибиотик.
   - Для сбора мочи используйте стерильные контейнеры, как было описано в предыдущих рекомендациях.
2. **Анализ крови**:
   - Сдайте **общий анализ крови (ОАК)** и **биохимический анализ крови** (креатинин, мочевина, С-реактивный белок). Это поможет оценить степень воспаления и функцию почек.
3. **Ультразвуковое исследование (УЗИ)**:
   - Пройдите **УЗИ почек, мочеточников и органов мошонки**. Это поможет выявить признаки воспаления, абсцесса или других осложнений.
4. **Консультация уролога**:
   - Обратитесь к урологу для осмотра и оценки состояния. Если лихорадка сохраняется или усиливается, **немедленно обратитесь в стационар**.
5. **Симптоматическое лечение**:
   - При повышении температуры выше 38.5°C можно принимать **парацетамол** (500–1000 мг каждые 6–8 часов, но не более 4 г в сутки).
   - Избегайте приёма нестероидных противовоспалительных препаратов (например, ибупрофена) без назначения врача, так как они могут ухудшить функцию почек.
6. **Гигиена и уход за стомой**:
   - Продолжайте тщательно ухаживать за стомой, промывая область вокруг неё тёплой водой с мягким мылом. Используйте защитные кремы для предотвращения раздражения кожи.
7. **Питьевой режим**:
   - Увеличьте потребление жидкости (не менее 2 литров в день), чтобы снизить концентрацию мочи и уменьшить риск инфекции.

Если симптомы сохраняются или ухудшаются, **не откладывайте визит к врачу**. Лихорадка и боли могут указывать на серьёзные осложнения, требующие немедленного лечения.