Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Александо

Возраст: 58

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 27.02.2025 22:01:17

формирования заключения врача: 27.02.2025 23:08:06

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/318678/answer/318687

Заключение врача

Жалобы

Пациент не предъявляет активных жалоб на момент обращения. Отсутствуют боли, колики или другие симптомы со стороны левой почки и мочеточника. Однако отмечается беспокойство по поводу расширения мочеточника и чашечно-лоханочной системы (ЧЛС), выявленного на УЗИ после операции.

Анамнез заболевания

В ноябре 2024 года пациенту была выполнена операция по поводу стриктуры левого мочеточника. В послеоперационном периоде развился орхоэпидидимит, вызванный внутрибольничной инфекцией. Пациент был выписан на амбулаторное лечение с назначением антибиотиков. Через день после выписки проведено УЗИ, которое выявило расширение прооперированного мочеточника и ЧЛС. Несмотря на это, лечащий уролог исключил необходимость повторной операции и рекомендовал динамическое наблюдение. На момент обращения состояние стабильное, без прогрессирования изменений.

Анамнез жизни

Данные о сопутствующих заболеваниях, аллергиях, вредных привычках и других значимых факторах отсутствуют. Уточнение этой информации может быть полезным для дальнейшего ведения пациента.

Интерпретация предоставленных данных

После операции по поводу стриктуры мочеточника у пациента развилось расширение мочеточника и ЧЛС, что может быть связано с нарушением оттока мочи на фоне послеоперационного отека, рубцовых изменений или других факторов. Отсутствие болевого синдрома и стабильность состояния указывают на компенсацию процесса. Однако расширение мочеточника требует дальнейшего наблюдения, так как может быть признаком частичной обструкции или нарушения функции мочеточника.

Заключение

У пациента после операции по поводу стриктуры левого мочеточника сохраняется расширение мочеточника и ЧЛС, выявленное на УЗИ. Состояние стабильное, без прогрессирования. Возможные причины: послеоперационные изменения, частичная обструкция или нарушение функции мочеточника. Необходимо исключить хроническую обструкцию и оценить функцию почки.

6) Рекомендации

1. **Динамическое наблюдение:** Рекомендуется продолжить наблюдение у уролога с регулярным проведением УЗИ почек и мочеточников (1 раз в 3-6 месяцев).
2. **Оценка функции почки:** Для исключения хронической обструкции и оценки функции почки рекомендуется выполнить:
    - Экскреторную урографию или КТ с контрастированием.
    - Радиоизотопное исследование почек (сцинтиграфию) для оценки функционального состояния левой почки.
3. **Контроль анализов:** Рекомендуется сдать общий анализ мочи и анализ мочи и посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам для исключения воспалительного процесса. Для удобства можно использовать тест-систему для экспресс-анализа мочи «Желтая бабочка».
4. **Консультация специалистов:** При ухудшении состояния (появление болей, лихорадки, изменений в анализах мочи) необходимо срочно обратиться к урологу.
5. **Общие рекомендации:**
    - Соблюдать питьевой режим (1,5-2 литра воды в день).
    - Избегать переохлаждения и чрезмерных физических нагрузок.
    - Следить за регулярностью мочеиспускания.