

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Сергей

Возраст: 40

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 28.02.2025 21:42:14

формирования заключения врача: 28.02.2025 22:29:46

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/318694/answer/318700>



Заключение врача

Жалобы

Пациент предъявляет жалобы на **невозможность закрытия головки полового члена после бурного полового акта**, а также на наличие **опухоли в нижней части полового члена**.

Анамнез заболевания

Согласно предоставленной информации, симптомы возникли после интенсивного полового акта. Пациент отмечает, что головка полового члена не возвращается в нормальное положение, а также наблюдается припухлость в нижней части органа.

Анамнез жизни

Дополнительная информация о состоянии здоровья пациента, наличии хронических заболеваний или предшествующих травм полового члена отсутствует.

Интерпретация предоставленных данных

Описанные симптомы могут указывать на состояние, известное как **парафимоз**. Парафимоз — это ургентное состояние, при котором крайняя плоть, оттянутая за головку полового члена, не может вернуться в исходное положение. Это приводит к сдавлению тканей, нарушению кровообращения и отеку. Если вовремя не оказать помощь, это может привести к некрозу тканей.

Опухоль в нижней части полового члена может быть связана с отеком, вызванным парафимозом, или с другими осложнениями, такими как травма или воспаление.

Заключение

На основании описанных симптомов можно предположить наличие **парафимоза**. Это состояние требует **немедленного медицинского вмешательства**.

Рекомендации

1. **Немедленно обратитесь к урологу или дежурному хирургу.** Парафимоз — это ургентное состояние, которое требует срочного лечения. Врач может попытаться вручную вернуть крайнюю плоть на место или, в случае неудачи, выполнить небольшой разрез для облегчения состояния.
2. Избегайте попыток самостоятельно вернуть крайнюю плоть на место, так как это может

усугубить ситуацию.

3. До обращения к врачу можно приложить холодный компресс к области отека для уменьшения боли и отека, но это не заменяет необходимости профессиональной помощи.
4. После оказания медицинской помощи обсудите с врачом возможность профилактики подобных ситуаций в будущем, включая рассмотрение вопроса о циркумцизии (обрезании), если это необходимо.

Пожалуйста, не откладывайте визит к врачу, так как промедление может привести к серьезным осложнениям.