Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Андрей

Возраст: 41

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 07.03.2025 14:39:50

формирования заключения врача: 07.03.2025 15:45:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/318765/answer/318766

Заключение врача

Жалобы

Пациент предъявляет жалобы на появление **водянистого пузыря на головке полового члена** после мастурбации, а также на **повышенную чувствительность головки**. Крайняя плоть обрезана.

Анамнез заболевания

Согласно предоставленной информации, симптомы возникают после мастурбации. Дополнительных данных о длительности симптомов, их прогрессировании или ранее проведенных обследованиях не указано.

Анамнез жизни

Пациент не сообщает о наличии хронических заболеваний, аллергий или других значимых событий в анамнезе, которые могли бы быть связаны с текущей проблемой.

Интерпретация предоставленных данных

Появление водянистого пузыря на головке полового члена после мастурбации может быть связано с несколькими причинами:

1. **Механическое раздражение**: Возможно, что трение во время мастурбации вызывает локальное раздражение кожи, что приводит к образованию пузыря.
2. **Аллергическая реакция**: Если пациент использует лубриканты или другие средства, это может вызвать аллергическую реакцию.
3. **Инфекционный процесс**: В редких случаях это может быть связано с начальной стадией инфекционного процесса, например, герпеса или другой инфекции.
4. **Повышенная чувствительность головки**: После обрезания кожа головки может стать более чувствительной к внешним воздействиям.

Заключение

На основании предоставленных данных можно предположить, что симптомы связаны с **механическим раздражением** или **аллергической реакцией**. Однако для исключения инфекционных причин требуется дополнительное обследование.

Рекомендации

1. **Исключить раздражающие факторы**: Рекомендуется временно воздержаться от мастурбациии и полового акта и наблюдать за состоянием. Если используются

лубриканты или другие средства, попробуйте их заменить на гипоаллергенные.
2. **Крем баланекс** местно 2 раза в день 7-10 дней
3. **Гигиена**: Соблюдайте тщательную гигиену половых органов, используя мягкие моющие средства без отдушек.
4. **Наблюдение**: Если пузырь не исчезает в течение нескольких дней или появляются дополнительные симптомы (зуд, жжение, покраснение), необходимо обратиться к урологу для очного осмотра.
5. **Дополнительные обследования**: Для исключения инфекционных причин рекомендуется сдать анализы:
    - Общий анализ мочи.
    - Мазок из уретры на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП).
6. **Психологический аспект**: Если повышенная чувствительность головки вызывает дискомфорт, обсудите это с партнером. Возможно, потребуется время для адаптации.

Если симптомы сохраняются или ухудшаются, настоятельно рекомендуется **очная консультация уролога** для более детального обследования и, при необходимости, назначения лечения.