Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Кристина

Возраст: 37

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 20.03.2025 13:10:30

формирования заключения врача: 20.03.2025 14:54:56

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/318887/answer/318891

Заключение врача

Жалобы

Пациентка, 37 лет, предъявляет жалобы на:

- **Торчащий конец стента из уретры** после замены стента в почке.
- **Постоянное подтекание мочи**, приводящее к мокрому нижнему белью.
- **Невозможность самостоятельного мочеиспускания**, предположительно из-за торчащего конца стента.
- **Незначительное кровотечение из влагалища**.

Анамнез заболевания

Сегодня пациентке была проведена замена стента в почке. После процедуры был оставлен торчащий конец стента из уретры. Ранее стент находился полностью внутри мочевого пузыря, и никаких проблем с мочеиспусканием или подтеканием мочи не наблюдалось. После замены стента пациентка отмечает ухудшение состояния: невозможность самостоятельного мочеиспускания, подтекание мочи и незначительное кровотечение из влагалища.

Анамнез жизни

Дополнительная информация о сопутствующих заболеваниях или значимых событиях в жизни пациентки отсутствует.

Интерпретация предоставленных данных

Судя по описанию, у пациентки может быть применен метод дренирования почки, при котором дистальный конец стента или мочеточникового катетера выводится наружу через уретру. Это может объяснить торчащий конец стента и связанные с этим симптомы. Однако, для точного понимания ситуации необходимо:

- **Фото торчащего конца стента** для оценки его положения и длины.
- **Сканы выписок** и результатов рентгена для уточнения положения стента и его функциональности.

Заключение

На основании предоставленной информации можно предположить, что торчащий конец стента может быть связан с методом дренирования почки. Однако, для уточнения диагноза и выбора дальнейшей тактики лечения необходимо:

- **Обратиться к лечащему урологу** для обсуждения текущей ситуации.
- **Предоставить дополнительную информацию** (фото, сканы выписок) для более

точной оценки.

Рекомендации

Для улучшения состояния и уточнения диагноза рекомендуется:

1. **Срочно обратиться к лечащему урологу** для обсуждения текущей ситуации и возможной коррекции положения стента.
2. **Сделать фото торчащего конца стента** и предоставить его врачу для оценки.
3. **Предоставить сканы выписок** и результатов рентгена для уточнения положения стента.
4. **Использовать урологические прокладки** для предотвращения мокрых трусов и улучшения комфорта.
5. **Избегать физических нагрузок** и соблюдать гигиену для предотвращения инфекций.

Если состояние ухудшится (например, усиление кровотечения, повышение температуры, сильная боль), необходимо **немедленно обратиться за медицинской помощью**.