

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Дмитрий

Возраст: 24

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 10.04.2025 02:56:19

формирования заключения врача: 10.04.2025 16:38:39

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/319008/answer/319014>



Заключение врача

Жалобы

Пациент предъявляет жалобы на:

- **Кровотечение из полового члена** (ниже головки), возникающее при половом акте или мастурбации
- **Болевые ощущения** во время полового акта

Анамнез заболевания

- Симптомы появились вчера после полового акта
- Кровотечение рецидивирует при сексуальной активности
- Данных о предшествующих травмах или заболеваниях полового члена не указано

Анамнез жизни

- Возраст 25 лет
- Сопутствующие заболевания не указаны

Интерпретация представленных данных

На основании описанных симптомов можно предположить:

1. **Травматическое повреждение** (разрыв уздечки или микротрещины кожи) - наиболее вероятная причина, учитывая связь с половым актом
2. **Воспалительный процесс** (баланопостит) - менее вероятно без указаний на зуд, покраснение, выделения
3. **Сосудистые аномалии** (варикозные расширения вен) - требует визуального подтверждения

Заключение

Наиболее вероятно **травматическое повреждение** полового члена (возможно, разрыв уздечки или микротравма кожи), возникшее во время полового акта. Состояние требует осмотра для уточнения локализации и степени повреждения.

Рекомендации

1. **Неотложные действия:**
 - Воздержаться от половых актов и мастурбации до осмотра врачом
 - При продолжающемся кровотечении - наложить стерильную повязку
2. **Обследования:**

- Очный осмотр уролога/андролога **в ближайшие дни**
- При возможности - сделать четкие фотографии области кровотечения (при хорошем освещении, с разных ракурсов)

3. Общие рекомендации:

- Гигиена полового члена с нейтральными моющими средствами
- Исключить ношение тесного белья
- При выраженной боли возможен прием парацетамола (не более 3-4 таблеток в сутки)

Дополнительная информация

Как сделать качественные фото для осмотра:

1. Используйте хорошее освещение (дневной свет или яркую лампу)
2. Сделайте несколько снимков: общий вид полового члена, крупный план места кровотечения
3. Постарайтесь зафиксировать кровотечение в момент его возникновения

Когда требуется срочная медицинская помощь:

- Если кровотечение обильное и не останавливается в течение 15-20 минут
- При появлении выраженного отека, посинения или сильной боли
- Если повышается температура тела

Рекомендую записаться на очный прием к урологу в ближайшие 1-2 дня для точной диагностики и предотвращения осложнений.