

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Олег

Возраст: 25

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 13.04.2025 16:47:36

формирования заключения врача: 13.04.2025 17:21:56

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/319044/answer/319045>



Заключение врача

Жалобы:

Появление небольшого (до 5 мм) тёмного куполообразного образования на внутреннем листке крайней плоти после полового контакта, слегка возвышающегося над кожей.

Анамнез заболевания:

Образование появилось однократно после полового акта, безболезненное, без признаков воспаления или изъязвления. Динамика не описана.

Анамнез жизни:

Сведений о сопутствующих заболеваниях, травмах или особенностях половой жизни не предоставлено.

Интерпретация представленных данных

На основании фото и описания выделяются следующие ключевые характеристики образования:

1. **Морфология:** чётко очерченное куполообразное возвышение
2. **Цвет:** тёмно-фиолетовый/чёрный без признаков воспаления
3. **Динамика:** появилось после механического воздействия (половой акт)

Дифференциальная диагностика

1. Подкожная гематома (наиболее вероятно):

- Возникает после микротравмы при половом акте
- Характерный тёмный цвет за счёт скопления крови
- Обычно рассасывается самостоятельно за 7-14 дней

2. Ангиокератома Фордайса:

- Доброкачественное сосудистое образование
- Может тромбироваться, приобретая тёмный цвет
- Чаще множественные, но могут быть единичными
- Не исчезает самостоятельно

3. Другие менее вероятные варианты:

- Пигментный невус
- Меланома (крайне маловероятно при такой клинической картине)
- Дерматофиброма

Рекомендации

1. Наблюдение:

- Отслеживать динамику образования в течение 2 недель
- Фотографировать каждые 3-4 дня для контроля изменений

2. Ограничения:

- Воздержаться от половых контактов до исчезновения образования
- Избегать механического воздействия на область

3. При появлении тревожных признаков срочно обратиться к урологу:

- Увеличение размера
- Появление боли или воспаления
- Изменение цвета или формы
- Кровоточивость

4. План дальнейшего обследования (при сохранении образования):

- Очный осмотр уролога/дерматолога
- Дерматоскопия
- При сомнениях — биопсия

Дополнительная информация

Для качественного фото при последующем контроле:

1. Используйте хорошее освещение
2. Сфокусируйтесь на образовании
3. Сделайте снимки с разных ракурсов
4. Укажите масштаб (например, рядом с линейкой)

В вашем случае наиболее вероятна небольшая подкожная гематома, которая должна рассосаться самостоятельно. Однако важно наблюдать за динамикой, чтобы исключить другие варианты.